

NOTA BREU

Validació de l'associació *Baldellio ranunculoidis-Oenanthe fistulosae* Mercadal, Gesti & Vilar 2008 i de diverses subassociacions del *Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae* Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992

Validation of the association *Baldellio ranunculoidis-Oenanthe fistulosae* Mercadal, Gesti & Vilar 2008 and several subassociations of *Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae* Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992

Gabriel Mercadal i Corominas*

* Herbari de la Universitat de Girona. Facultat de Ciències. Campus Montilivi. C/ M. Aurèlia Campmany, 69. 17003 Girona. A/e: g.mercadal.corominas@gmail.com

Rebut: 13.04.2018. Acceptat: 04.06.2018. Publicat: 30.06.2018

El Codi Internacional de Nomenclatura Fitosociològica (Weber *et al.*, 2000; Izco & Arco-Aguilar, 2003) inclou totes les prescripcions necessàries per publicar vàlidament un sintàxon. La normativa és molt exhaustiva per garantir la seva coherència, legitimitat i prioritat. L'incompliment d'alguns articles concrets comporta la invalidesa automàtica del sintàxon. Tanmateix, en certs casos, el codi és extremadament rígid, com en el cas que ens ocupa, i algun formalisme molt específic, i poc important per la tipificació en si del sintàxon, deixa sense valor la feina feta. Així doncs, per tal de complir tots els criteris de la normativa, validem de nou diverses unitats sintaxòniques publicades per l'autor i alguns col·legues que no compleixen estrictament l'article 5 de CINF. En el nostre cas, el defecte ha estat no indicar «*expressis verbis*» el tipus nomenclatural dels sintàxons amb la paraula llatina «*typus*» («*holotypus*» o «*lectotypus*») i emprar en canvi la catalana «tipus» («holotip» o «lectotip»).

Sintàxons que es validen

Baldellio ranunculoidis-Oenanthe fistulosae Mercadal, Gesti & Vilar *ass. nova hoc loco* [*Baldellio ranunculoidis-Oenanthe fistulosae* Mercadal, Gesti & Vilar 2008 *nom. inval.* art. 5]. *Holotypus*: Mercadal *et al.* (2008), *Orsis* 23: 50, tab. 1, rel. 1 (Catalunya: Alt Empordà, La Jonquera, estany de Terra Negra, 31TDG9294). Espècies característiques: *Oenanthe fistulosa*, *Baldellia ranunculoides* subsp. *ranunculoides*, *Eleocharis palustris* subsp. *palustris*, *E. palustris* subsp. *uniglumis*, *Gratiola officinalis*, *Mentha pulegium*, *Cardamine parviflora* (caract. terr. de la serra de l'Albera).

juncetosum acutiflori Mercadal, Gesti & Vilar *subass. nova hoc loco* (= *typicum*) [*juncetosum acutiflori* Mercadal, Gesti & Vilar 2008 *nom. inval.* art. 5]. Espècies diferencials:

Juncus acutiflorus, *Baldellia ranunculoides* subsp. *ranunculoides*, *Gratiola officinalis*.

caricetosum cuprinae Mercadal, Gesti & Vilar *subass. nova hoc loco* [*caricetosum cuprinae* Mercadal, Gesti & Vilar 2008 *nom. inval.* art. 5]. *Holotypus*: Mercadal *et al.* (2008), *Orsis* 23: 52, tab. 2, rel. 1 (Catalunya: La Selva, Caldes de Malavella, prats de Ca n'Oms, 31TDG8832). Espècies diferencials: *Carex vulpina* subsp. *cuprina*, *Ranunculus sardous* subsp. *sardous*, *Iris pseudacorus*.

Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992. *Lectotypus*: Pedrotti (1970), Tipografia Succ. Savini-Mercuri, Camerino, (pàg. tab. s/n), tab. 2, rel. 1, (Itàlia, Abruzzo, bosco di Don Venanzio lungo il Fiume Sinello, 30 m), designat a Pedrotti (1992).

typicum [*populetosum albae* Mercadal & Vilar 2013 *nom. inval.* art. 5]. Espècies diferencials: *Populus alba*, *Stachys sylvatica*, *Sison amomum*, *Tamus communis*, *Solanum dulcamara*, *Lonicera caprifolium*.

alnetosum glutinosae Gellini, Pedrotti & Venanzoni 1986 em. Mercadal & Vilar [*alnetosum glutinosae* Gellini, Pedrotti & Venanzoni 1986 em. Mercadal & Vilar 2013 *nom. inval.* art. 5]. *Lectotypus hoc loco*: Gellini *et al.* (1986), *Documents phytosociologiques*, N.S. X(II): 27-42 (pàg. tab. s/n), tab. 3, rel. 7 (Itàlia: Toscana, Pisa, Selva de San Rossore, Fiume Morto Vecchio). Espècies diferencials: *Alnus glutinosa*, *Mentha aquatica*, *Juncus effusus*, *Cardamine pratensis*.

caricetosum cuprinae Mercadal & Vilar *subass. nova hoc loco* [*caricetosum cuprinae* Mercadal & Vilar 2013 *nom. inval.* art. 5]. *Holotypus*: Mercadal & Vilar (2013), *Orsis*,

NOTA BREU

27: 68, tab. 4, rel. 4 (Catalunya: La Selva, Riudarenes, a la Camparra, 82 m, 31TDG7330). Espècies diferencials: *Carex vulpina* subsp. *cuprina*, *C. riparia*, *Rumex crispus*, *Oenanthe fistulosa*.

quercetosum pubescentis Mercadal & Vilar subass. nova hoc loco [*quercetosum pubescentis* Mercadal & Vilar 2013 nom. inval. art. 5]. Holotypus: Mercadal & Vilar (2013), *Orsis*, 27: 64, tab. 3, rel. 4 (Catalunya: La Selva, Sils, a l'antic estany, vora el camí vell de Sils a Maçanet de La Selva, 67 m, 31TDG7827). Espècies diferencials: *Quercus pubescens*, *Rosa canina*, *Torilis arvensis* subsp. *neglecta*.

quercetosum roboris Mercadal & Vilar subass. nova hoc loco [*quercetosum roboris* Mercadal & Vilar 2013 nom. inval. art. 5]. Holotypus: Mercadal & Vilar (2013), *Orsis*, 27: 60, tab. 2, rel. 3 (Catalunya, Maresme, Tordera, a la roureda de Can Verdalet, 25 m, 31TDG7618). Espècies diferencials: *Quercus robur*, *Q. canariensis*, *Lonicera periclymenum*, *Sorbus torminalis*, *Laurus nobilis*, *Luzula forsteri*, *Conopodium majus* subsp. *majus*.

Bibliografia

- MERCADAL, G., GESTI, J. & VILAR, L. 2008. L'herbassar de felandri fistulós i baldèl·lia (*Baldellia ranunculoidis-Oenanthe fistulosae*), una nova associació herbàcia higròfila dels Països Catalans. *Orsis*, 23: 47-73.
- MERCADAL, G. & VILAR, L. 2013. Caracterització de les freixenedes al·luvials inundables del nord-est de Catalunya (*Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae* Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992). *Orsis*, 27: 53-94.
- IZCO, J. & ARCO-AGUILAR, M. J. DEL. 2003. *Código internacional de nomenclatura fitosociológica*. Materiales didácticos universitarios, serie Botánica/2. Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna. La Laguna. 154 p.
- GELLINI, R., PEDROTTI, F. & VENANZONI, R. 1986. Le associazioni forestali ripariali e palustri della Selva di San Rossore (Pisa). *Documents phytosociologiques*, N.S. X(II): 27-42.
- PEDROTTI, F. 1970. *Un relito di bosco planiziare a Quercus robur e Fraxinus angustifolia a lungo il fiume Sinello in Abruzzo*. Tipografia Succ. Savini-Mercuri. Camerino. 23 p.
- PEDROTTI, F. 1992. Tipificazione e correzione dell'associazione *Carici-Fraxinetum angustifoliae* Pedrotti 1970. *Documents phytosociologiques*, XIV: 165-166.
- WEBER, H. E., MORAVEC, J. & THEURILLAT, J.-P. 2000. International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd edition. *Journal of Vegetation Science*, 11: 739-768.