

## Contribución al estudio de los Coleópteros catalanes

POR

RICARDO ZARIQUIEY

En el Boletín de Diciembre último anunciaba ya la captura de una *Reicheia* y un *Scotodipnus*, prometiendo una vez ya clasificados una pequeña nota sobre los mismos que, gracias a la amabilidad de D. Cándido Bolívar puedo hoy presentar.

Según me comunica dicho señor, en atenta carta del 12 del pasado, la *Reicheia* es casi seguramente la especie *lucifuga* Saulcy, descrita de los Pirineos orientales y que se ha encontrado después en Córcega.

Nosotros la encontramos primeramente el mes de Noviembre (1915) en musgo procedente de la Rabasada. Animados por su encuentro recogimos otro saco, esta vez de Vallvidrera, que nos proporcionó nuevos ejemplares.

El *Scotodipnus* es el *Pandellei* probablemente la variedad *rialensis* Guill., descrita de Ria, en los Pirineos orientales. Tenemos dos ejemplares, el primero del Montseny (VIII-15) cogido cerca de la riera de Gualba debajo de una piedra, y el segundo, de Vallgorguina (8-X-15) cogido cuando menos lo esperábamos. En efecto, habiendo tenido que pasar por allí, nos detuvimos un rato y del borde de la carretera recogimos detritus, hojas secas que, metidos dentro de un saquito, llevamos a casa; explorando después aquel pequeño mundo encontramos con la natural sorpresa y alegría, entre otras varias especies, el *Scotodipnus*.

Estos últimos domingos hemos recorrido Vallvidrera y el Tibidabo levantando afanosos todas cuantas piedras caían bajo nuestras manos hasta el punto de atraer sobre nosotros las reconvenciones y las miradas inquisitoriales de un guarda bosque que encontraba muy raro nos entretuviésemos en levantar piedras para buscar coleópteros y que temía que al final éstos se convirtiesen en conejos.

A pesar de todo este trabajo, a pesar de que nuestros riñones protestaban indignados de aquel continuo levantarse y agacharse, no hemos tenido la suerte de tropezar con el *Scotodipnus Ganglbaueri* que dicen se encuentra por estas localidades.

Hemos cogido algo notable, medones, pselafidos, scydmenidos y una pareja de *Platytarsus (Cymindoidea)*, carábidos poco frecuentes y que no sabemos si se ha citado ya en Cataluña.

Barcelona 1.º Marzo 1916.

---

## Un ou teratològic

PER

J. M. DE BARÑOLA, S. J.

Amb la denominació vulgar d'*un ou amb cua* ens va ésser entregat un fenòmeno teratològic observat en un ou de gallina, segons breument comunicarem en la sessió del 4 d'Abril. Molt expressiva resulta la frasis i acomodada a la realitat, però no sabem que l'anomalia, segurament escassa, de que volem parlar, tingui particular denominació en teratologia embriològica. S'en podria dir un ou *uròfer*.

L'aspecte de l'ou, qual gravat prè de fotografia directa acompanya aquesta nota, indica d'un modo clar que's tracta del allargament i col·locació externa d'una de les *chalaçes*, la corresponenta a la punta grossa o pol major de l'ou, que es precisament aquell on se forma amb el procés germinatiu la *cambrà aèria*. Aquesta exteriorització o *exclusió* de la chalaça posterior, recoberta de calixa, com la membrana externa de l'ou, i conservant sa forma allargada en espiral, la podem compendre recordant primerament el seu procés de formació normal, junt amb el de l'*albúmina* o clara de l'ou.