

la Serra de Montsec, desconeguda fins avui de Catalunya. De tot el material del Montsec d'Ares, potser siga el gènere *Pendulina*, nou també per a Catalunya, el que ofereix més interès.

Contribució al coneixement dels nostres Lepidòpters.—El Sr. Sagarra dóna compte del resultat de les exploracions del passat istiu en l'ordre lepidopterològic. Comunica algunes troballes d'interès, com una forma ♀ *caerulea* pertanyent al grupu *Lycaena argus* L. *argyrognomon* Brgstr. recollida a Uldecona per En Pius Font; del mateix consoci té le *Lycaena admetus* Esp. de Sant Guim, i claricies d'interès sobre els Lepidòpters del Montsec. Aquest conjunt de noves formarà un treball especial.

Excursió col·lectiva.—S'acorda fer l'excursió col·lectiva d'Octubre el proper dia 8 a les esclètxes de Papiol.

Noves herpetològiques

per

JOAQUIM MALUQUER

I.—ADICIONS A LA HERPETOFAUNA CATALANA

Lacerta muralis Lilfordi Günth.

Sinonímies i bibliografia:

Zootoca Lilfordi, part. Günth. Ams. & Mag. N. H. (4) XIV. pàg. 158. (1874).

Lacerta Lilfordi Braun. Arb. Zool. Inst. Würzb. IV. pàg. 1 (1877).

Lacerta muralis var. *Lilfordi* Bedriaga, Bull. Soc. Zool. France, pàgina 225, pl. IX, figs. 1-2. (1879).

Característiques:

Escates petitíssimes, unes vuitanta al voltant del cos en el centre corresponent-ne sis al ventre. Les potes posteriors assolint l'axil·la. Color negra per sobre i blavosa inferiorment.

Dimensions:

Llargària total	140 m/m
Cap.	17 »
Amplada del cap	10 »
De la punta del morro a la pota anterior	22 »
De la punta del morro a l'anús	50 »
Potes anteriors	20 »
Potes posteriors	30 »
Cua.	90 »

Procedència: Bosc de Cordelles, Cerdanyola (Barcelona) leg. Mn. Garriga (1).

Conservat: En alcohol, en la meua col·lecció.

Tropidonotus viperinus aurolineatus Gervais.

Sinonímies i bibliografia:

- Coluber viperinus* var. *aurolineatus* Gervais. Ann. d. Sc. natur. 2.º ser. VI, pàg. 312, (1836).
- Natrix viperina* var. *bilineata* Bonaparte. Amph. europ. pàg. 53, (1839).
- Tropidonotus chersoides* Dum. et Bibr. Erpétol. génér. VII, 1, pàg. 562, 3, (1854).
- Tropidonotus viperinus* var. *b*). Schreiber, Herpetol. europ. pàg. 226, (1875).

Característiques:

Aquesta formosa varietat és caracteritzada per tenir dues ratlles groguenques tot al llarg de l'esquena i a més presentar un sol rengle de taques vertebrals, negres. L'exemplar estudiat tenia:

Llargària total	490 m/m
Cua.	90 »
Fileres d'escates	21 »
Escuts ventrals	151 »
Escuts subcaudals	47 »

(1) En 8-10-1916, he tingut ocasió de visitar la col·lecció de Rept. i Amfib. del Monestir de Montserrat, aplegats per aquells voltants per el nostre consoci P. Marcet, en la qual figuren diverses *L. muralis Lilfordi*, que seràn objecte d'un estudi especial.

Procedència: Voltants de Barcelona.

Conservat: En alcohol, en la meua col·lecció.

Zamenis hippocrepis Linné.

Sinonímies i bibliografia:

Coluber hippocrepis Linné, Mus. Ad. Fred. I, 16, t. 2, i Syst. nat, pàg. 388.

Coluber domesticus Linné, Syst. nat. I, pàg. 389, 341. (1767).

Natrix hippocrepis Merrem, Syst. amph. pàg. 105, 50. (1820).

Haemorrhoids-hippocrepis Boie, Gener. übers. d. Fam. u. Gatt. d. Ophid. Isis XIX, pàg. 982. (1826).

Periops hippocrepis Wagler, Natürl. Syst. d. Amphib. pàg. 189. (1830).

Calopeltis hippocrepis Eichw. Nouv. Mem. Soc. Imp. nat. Moscou, IX, pàg. 441. (1839).

Zamenis hippocrepis Günther, Catal. of. Colubr. Snak. pàg. 103, 2 (1858).

Periops hippocrepis Schreiber, Herpetol europ. pàg. 260. (1875).

Característiques:

Es l'únic colúbrid europeu, que presenta una sèrie d'escuts suboculars que separen completament quasi sempre, els supralabials dels ulls.

L'exemplar únic, recollit a Catalunya, a que fem referència, té: 1 preocular; 2 postoculars; 3 suboculars en un costat i 2 en l'altre, que separen completament l'ull dels supralabials; 2-2 temporals; 8 i 9 supralabials; 4 sublabials en contacte amb cada inframaxil·lar anterior. Escates en 27 fileres cap al centre del còs, i 8 fileres sobre la cua. Ventrals, 236, anal enter; subcaudals, 95.

Llargària total: 380 m/m. Cua, 76 m/m. Taques dorsals i laterals, bru fosques, vorejades de negre. Ventre salmonat concolor.

Procedència: Vallcarca, 17-IX-16.

Conservat: Viu en un terrari del Museu de Catalunya.

Coelopeltis monspessulana Neumayeri Fitz.

Sinonímies i bibliografia:

Coluber Neumayeri Fitzinger, Classificat. d. Reptil. pàg. 57, 13, (1826).

Bothrops distinctus Eichw. Reise Caucas, I, 2, pàg. 748. (1836):

- Rhabdodon fuscus* Fleischm. Dalmat. növe serpent. gen. pàg. 26, tab. II. (1831).
- Coluber fuscus* Schinz. Naturg. u. Abbild. d. Reptil, pàg. 150, tab. 64, fig. 2. (1833).
- Coelopeltis monspessulana* var. *Neumayeri* Bonaparte. Amph. europ. pàgina 45. (1839).
- Coelopeltis lacertina* var. *d*). Schreiber. Herpetol. europ. pàg. 222. (1875).

Característiques:

Color bruna uniforme per sobre, ventre groc-blanc. Cap sense taques. El primer exemplar estudiat tenia:

Llargària total	1,000 m/m
Cua	50 »
Fileres d'escates	19 »
Escuts ventrals	175 »
Escuts subcaudals	13 »

Procedència: Monjuïc (Barcelona).

Conservat: Viu en un terrarium del Museu de Catalunya.

Aquesta varietat és comuna a Catalunya, tant com el tipus, presentant-se en totes les coloracions intermitges. En l'exemplar de referència és sens dubte degut a algún accident o baralla la pèrdua del tros de cua que li manca.

II. — CONTRIBUTIÓ AL CONEIXEMENT DE LA FAUNA DE CATALUNYA

En el BUTLLETÍ de gener de 1916 (1), figura una nota on són citats alguns exemplars herpetològics recollits per mí. A continuació dono una relació de les espècies que no figuren en aquella nota i que personalment he pogut estudiar durant l'istiu darrer.

(1) Pàg. 11.