

NOVES LOCALITZACIONS D'OPISTOBRANQUIS ALS PAÏSOS CATALANS

Cristian R. Altaba * i Anna Traveset *

Rebut: març de 1984

SUMMARY

New findings of Opisthobranchs in the Catalan Countries

New data are presented on the geographical distribution of Opisthobranch molluscs in the Catalan Countries (Catalonia, Valencia and the Balearic Islands). Despite recent studies of this group along the Catalan coast, there is still much to be known about them, especially the Pyramidellids. Most of the species mentioned here have been found in tanatoenoses.

La present nota és un esment d'una selecció de les espècies d'opistobranquis més interessants que hem trobat a les nostres costes, alguns dels quals no havien estat mai citats ací a causa, malauradament, de la manca d'estudi d'aquest grup de gasteròpodes.

S'han fet revisions dels opistobranquis de la nostra mar (WIRZ-MANGOLD & WYSS, 1958; ROS, 1975; BALLESTEROS, 1981), però sense aprofundir en els piramideïacis, dels quals, a causa de la seva reduïda grandària i gran nombre de formes, es desconeix pràcticament tot, de manera que fins ara llur sistemàtica ha estat basada simplement en la conquilla. La majoria d'espècies d'aquest grup ha estat trobat en tanacocenosis.

Ordre Cephalaspidea
Família Scaphandridae
Cylichna (Cylichnella) crossei
(Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1886)

Un exemplar mort a la platja d'Es Grao (Menorca), VII-1979. Un exemplar mort a la platja d'Alcúdia (Mallorca), X-1979.

Altres localitzacions catalanes: platja de Canet de Rosselló (BUCQUOY, DAUTZENBERG & DOLLFUS, 1886); Blanes (Selva), fons de sorra amb micromolluscs, a la banda exterior de l'escullera del port, més de 100 exemplars (ROS, 1975); conquilles a les platges d'Es Grao i Cala en Porter (Menorca) (ALTIMIRA, 1972); conquilles a les platges de Portbou i Garbet (Alt Empordà) (ALTIMIRA, 1975).

* Departament d'Ecologia. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 645. 08028 Barcelona.

Diagnosi: BUCQUOY, DAUTZENBERG & DOLLFUS (1886).

Distribució: Mediterrani.

L'espècie és nova per a l'illa de Mallorca.

Cylichna (s.s.) alba (Brown, 1827)

Un exemplar mort a la platja d'Alcúdia (Mallorca), X-1979.

Altres localitzacions catalanes: Eivissa (NORDSIECK, 1972); conquilles a la platja d'Es Grao (Menorca) (ALTIMIRA, 1973).

Diagnosi: NORDSIECK (1972).

Distribució: Atlàctic nord, Mediterrani, Brasil.

L'espècie és nova per a l'illa de Mallorca.

Família Atyidae

Atys (Roxaniella) jeffreysi

(Weinkauff, 1866)

Un exemplar mort entre xarxes calades sobre fons de *Posidonia oceanica*, a 7,5 metres de profunditat, l'Ampolla (Baix Ebre), III-1979.

Altres localitzacions catalanes: Eivissa (NORDSIECK, 1972); Port de Sóller (2 exemplars), Sant Jordi (4 ex.), en estòmacs de grans astèrids (GASULL & CUERDA, 1974); Sant Pol de Mar (Maresme), en estòmacs d'astèrids (ALTIMIRA, 1977a).

Diagnosi: PRUVOT-FOL (1954).

Distribució: Mediterrani nord-occidental.

Ordre Ascoglossa

Família Oxynoidae

Lobiger serradifalci (Calcara, 1840)

Un exemplar mort a la banda sud de l'istme sorrenc de Peníscola (Baix Maestrat), XII-1978; l'animal, ja mig sec, presentava una coloració vermellosa intensa.

Altres localitzacions catalanes: Balears (CARUS, 1889-1893) (VAYSSIÈRE, 1885); platja de Sa Punta, Maó (Menorca) (HIDALGO, 1917).

Diagnosi: GONOR (1961).

Distribució: Mediterrani,

Família Polybranchiidae

Bosellia mimetica Trinchese, 1890

Dos exemplars sobre *Halimeda tuna* en una paret vertical orientada al nord, a 2 m

de profunditat, en un pas de molt corrent, a la platja de Santa Cristina, Lloret de Mar (Selva), VIII-1983.

Altres localitzacions catalanes: Banyuls (Vallespir), freqüent des del II-1957, sobre *Halimeda tuna* o excepcionalment *Udotea* (PORTMANN, 1958; WIRZ-MANGOLD & WYSS, 1958); Tossa de Mar (Selva), un exemplar sobre *Halimeda tuna*, a dues milles aproximadament al sud del poble, a uns 500 m de la costa, sobre fons de pre-corallígen amb abundant *Peyssonella*, *Udotea* i *Halimeda*, a uns 22 m de profunditat (BALLESTEROS, 1979).

Diagnosi: PORTMANN (1958), SCHMEKEL & PORTMANN (1982).

Distribució: Mediterrani occidental i Carib sud.

Ordre Arminacea

Família Arminidae

Armina maculata Rafinesque, 1814

Quatre exemplars pescats al ròssec a Roses (Alt Empordà), sobre fons de fang a uns 50 m de profunditat, VIII-1977 (Ortenisi, col.). Rep el nom popular d'«orelletes».

Altres localitzacions catalanes: Barcelona, 10 ex. pescats al ròssec sobre fons fangós o sorrenc fangós, entre 70 i 150 m de profunditat (BALLESTEROS, 1981); Banyuls (Vallespir), cinquanta exemplars a 20-70 m de profunditat, davant del laboratori Ara-gó, 1974-1980 (SCHMEKEL & PORTMANN, 1982).

Diagnosi: BALLESTEROS (1981).

Distribució: Mediterrani occidental i Atlàtic oriental des del golf de Gascunya fins a la costa oest d'Africa.

Ordre Pyramidellomorpha

Família Pyramidellidae

Chrysallida (Parthenina) suturalis

(Philippi, 1844)

Un exemplar entre xarxes calades sobre corallígen, Lloret de Mar (Selva), IV-1979.

Altres localitzacions catalanes: Sant Pol de Mar (Maresme) (ALTIMIRA, 1980).

Diagnosi: NORDSIECK (1972).

Distribució: Mediterrani occidental i Atlàtic proper.

Phasianema costatum (Broceli, 1814)

Un exemplar mort a la platja de Lloret de Mar (Selva), VIII-1975. Un exemplar mort a la platja de l'Escala (Baix Empordà), IV-1979.

Altres localitzacions catalanes: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i platja de l'Arenal (Baix Ebre) (ALTIMIRA, 1976); l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) (ROS & ALTIMIRA, 1977); illes Medes (Baix Empordà) (ALTIMIRA, HUELIN & ROS, 1981).

Diagnosi: NORDSIECK (1972), ROS & ALTIMIRA (1977).

Distribució: Mediterrani occidental i Atlàctic proper.

Turbonilla (s.s.) hoeki

Dautzenberg & Hamonville, 1896

Sis exemplars morts a la platja d'Alcúdia (Mallorca), X-1979.

Altres localitzacions catalanes: l'Ampolla i platja de l'Arenal (Baix Ebre) (ALTIMIRA, 1976); platges de Portbou i Garbet (Alt Empordà), Cubelles, Vilanova (Garraf) (ALTIMIRA, 1977b).

Diagnosi: NORDSIECK (1972).

Distribució: Cantàbric, Açores i Mediterrani nord-occidental.

L'espècie és nova per a les illes Balears.

Odostomia (Brachystomia) ambigua novegradensis (Brusina, 1865)

Un exemplar mort a la platja de l'Escala (Baix Empordà), IV-1979.

Altres localitzacions catalanes: Garraf (Garraf) (ROS, 1975; ALTIMIRA & ROS, 1977).

Diagnosi: NORDSIECK (1972).

Distribució: Mediterrani, Mar Negra i Atlàtic proper.

Eulimella (Ptycheulimella) praelonga (Jeffreys, 1884)

Un exemplar entre xarxes calades sobre fons de sorra de gra mitjà amb *Posidonia oceanica*, a uns 12 m de profunditat, Arenys de Mar (Maresme), II-1980.

Un exemplar entre xarxes calades sobre coral·ligen, a uns 50 m de profunditat, Lloret de Mar (Selva), VII-1979.

Diagnosi: NORDSIECK (1972).

Distribució: Mediterrani i Atlàtic proper.

L'espècie és nova per a la fauna dels Països Catalans.

AGRAÏMENTS

A Joandomènec Ros (Dept. Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia), Manuel Ballesteros (Dept. Zoología, Fac. Biología, Universitat de Barcelona), Joan Ortensi (Roses), i molt especialment al desaparegut Carles Altimira (Barcelona).

BIBLIOGRAFIA

- ALTIMIRA, C. 1972. Notas malacológicas. XVI. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica marina de Menorca. *P. Inst. Biol. Apl.*, 53: 33-52.
- ALTIMIRA, C. 1973. Notas malacológicas. (18). Datos sobre la fauna malacológica marina de la isla de Menorca. *Misc. Zool.*, 3 (3): 9-10.
- ALTIMIRA, C. 1975. Moluscos testáceos recolectados en el litoral de la parte norte de la provincia de Girona (Mediterráneo occidental español). *Inv. Pesq.*, 39 (1): 63-78.
- ALTIMIRA, C. 1976. Moluscos testáceos recolectados en el litoral sur de Tarragona (Delta del Ebro) (Mediterráneo occidental español). *Ibid.*, 40 (2): 581-595.
- ALTIMIRA, C. 1977a. Fauna malacológica marina de Sant Pol de Mar (Litoral N. de la provincia de Barcelona). Primera parte. *Misc. Zool.*, 4 (1): 23-32.
- ALTIMIRA, C. 1977b. Moluscos testáceos recolectados en el litoral del norte de la provincia de Gerona (Mediterráneo occidental español). *Inv. Pesq.*, 41 (3): 569-573.
- ALTIMIRA, C. 1980. Fauna malacológica marina de Sant Pol de Mar (Litoral N. de la provincia de Barcelona). II. *Ibid.*, 44 (2): 297-304.
- ALTIMIRA, C., HUELIN, M. F. & ROS, J. D. 1981. Moluscos bentónicos de les Illes Medes (Girona). I. Sistemàtica. *Butll. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 47 (Sec. Zool.), 4: 69-75.
- BALLESTEROS, M. 1979. *Bosellia mimetica* Trinchesse 1891 y *Elysia timida* Risso 1818 dos sacoglosos nuevos para la fauna ibérica. *P. Dept. Zool. Barcelona*, 4: 13-17.
- BALLESTEROS, M. 1981. Sobre un raro armináceo (Mollusca: Opistobranchia) de la costa mediterránea española: *Armina maculata* Rafinesque, 1814. *Ibid.*, 6: 27-31.
- BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, P. & DOLLFUS, G. 1886. *Les Mollusques Marins du Roussillon*. 1: *Gastéropodes*. Baillière. París.

- CARUS, J. V. 1889-1893. *Prodromus Faunae Mediterraneanae. Sive descriptio animalium maris Mediterranei incolarum*. Schweizerbarstsche. Stuttgart.
- GASULL, L. & CUERDA, J. 1974. Malacología del contenido gástrico de las grandes estrellas de mar. *Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares*, 19: 155-175.
- HIDALGO, J. G. 1917. Fauna malacológica de España, Portugal y las Baleares. *Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat., ser. Zool.*, 30: 1-752.
- NORDSIECK, F. 1972. *Die europäischen Meeresschnecken (Opistobranchia mit Pyramidellidae; Risssoacea)*. G. Fischer. Stuttgart.
- PORTMANN, A. 1958. *Bosellia mimetica* Trinchese, Opistobranche retrouvé en Méditerranée. *Vie Milieu*, 9 (1): 74-80.
- PRUVOT-FOL, A. 1954. *Mollusques Opistobranches. Faune de France*, 58. Pane Lechevalier. París.
- Ros, J. D. 1975. Opistobranquios (*Gastropoda: Euthyneura*) del litoral ibérico. *Inv. Pesq.*, 39 (2): 269-372.
- Ros, J. D. & ALTIMIRA, C. 1977. Comunidades bentónicas de sustrato duro del litoral NE español. V. Sistemática de moluscos. *Misc. Zool.*, 4 (1): 43-55.
- SCHMEKEL, L. & PORTMANN, A. 1982. *Opistobranchia des Mittelmeeres. Nudibranchia und Sacoglossa. Fauna e Flora del Golfo di Napoli*, 40. Springer-Verlag. Berlín.
- VAYSSIÈRE, A. 1913. *Mollusques de la France et des Régions voisines. I. Bibliothèque de Zoologie, Encyclopédie Scientifique*. Doin. París.
- WIRZ-MANGOLD, K. & WYSS, U. 1958. Faune marine des Pyrénées-Orientales, 3. Opistobranches. *Suppl. Vie Milieu*, 9 (3): 1-71.