

## Algunos Coleópteros Catalanes

por

R. ZARQUÍEY

Como la base más a propósito para poder llegar el día de mañana a formar el catálogo completo de la fauna de una región, son las listas publicadas de ejemplares pertenecientes ya a familias aisladas ya a localidades determinadas, creo no está de más el que cite aquí algunos coleópteros recogidos por nosotros, sirviendo de disculpa el motivo que me impulsa a la vulgaridad de alguno de ellos.

Sirvan también estas líneas de modesto homenaje a los Srs. Clermont, Buysson y Codina a quienes debo la determinación de las especies aquí citadas.

### HALIPLIDÆ

*Haliplus guttatus* AUBÉ

Caldas de Bohí. VII-16. Propio de Francia meridional, Italia, Grecia y Hungría.

### DYTISCIDÆ

*Hydroporus Sanmarki* ab. *rivalis* GYLLH.

Junto con el tipo en Caldas de Bohí VII-16. Citado sólo de Portugal, nuevo para España.

### ELATERIDÆ

*Corymbites purpureus* var. *flavus* GREDE

Propio del Tirol, nuevo para la Península. Capdella VII-16.

- Agriotes sordidus* var. *Buyssoni* PIC  
Prat del Llobregat, 16-IV-15. Conocido de Francia meridional;  
nuevo para la Península.
- Silesis rutilipennis* ILLIG.  
Figueras, VII-15. Conocido de Francia meridional y Portugal.  
Besós (B) 17-VI-12 (Codina!); Figaró (B.) 16-VII-14 (Codina!).
- Hypnoidus (Zorochores) dermestoides* HERBST  
Capdella VIII-16.
- Hypnoidus (Zorochores) dermestoides* var. *tetragraphus* GERM.  
Río Besós, 28-III-15.
- Hypnoidus (Zorochores) curtus* GERM.  
R. Besós, 30-V-15; Can Tunis, 12-III-16. Citado de Sicilia y An-  
dalucía.
- Cardiophorus rufipes* GEOFFR.  
Cataluña.
- Idolus picipennis* ab. *scapulatus* CAND.  
Montseny, 8-VI-16. Conocido de los Alpes y Pirineos.
- Pheletes quercus* var. *Candezei* BUYSS.  
Montserrat, VI-15. Especie probablemente nueva para Cataluña.
- Athous lateralis* BRIS.  
Queralt, VIII-14. Propio de España, quizá no citado todavía en  
Cataluña.
- Athous difficilis* DUF. (*cantabricus* Schauf.)  
Capdella VII-16. Conocido de los Pirineos Occidentales.

## CURCULIONIDÆ

- Lixus punctiventris* BOH.  
Montserrat, VI-14.
- Dorytomus taeniatus* F.  
Prat del Llobregat, 7-III-15.
- Rhinoncus perpendicularis* REICH.  
Prat del Llobregat, 7-III-15.
- Ceutorrhyncus nigrinus* MARSH.  
Campos próximos a la calle de Ganduxer (Bonanova), 30-III-15.

*Ceutorrhynchus floralis* PAYK.

Prat, 7-III-15; S. Boy, 12-IV-16.

*Ceutorrhynchus laetus* ROSH.

Calle de Ganduxer (Bonanova), 30-III-15. Descrito sobre ejemplares de Andalucía.

*Tychius Schneideri* HERBST

Montserrat, VI-16.

*Rhynchites coeruleus* DEG.

Vallvidrera, III-15. Sobre el tronco de un árbol cerca del Pantano.

#### IPIDÆ

*Ips erosus* WOLLAST.

Cogido en Vallvidrera el 20-II-16. Conocido de Francia y Grecia, nuevo para Cataluña.

#### SCARABÆIDÆ

*Amphimallus solstitialis* var. *ochraceus* KNOCH.

Caldas de Bohí, VII-16, junto con el tipo. Propio de Inglaterra, Francia y Austria; probablemente no citado aún de la Península.

*Cetonia aurata* ab. *pallida* DRURY

Collell (Prov. Gerona), VI-16. En «Curti, Revisión der Paläarktischen Arten der Gattung Cetonia» (Entomologische Mitteilungen, vol. II, N.º 12 (1913) pag. 372), la ab. *pallida* Drury, figura como propia del Asia menor, Siria.

Barcelona 1 Junio 1917.

---