

## NUEVAS APORTACIONES A LA MALACOFAUNA DE CATALUÑA

Miquel Bech \* y Fermí Ramírez \*\*

Rebut: març de 1988

### ABSTRACT

#### New data on the malacofauna of Catalonia (Spain)

New distributional and faunistic data are given on the land molluscs of Catalonia. *Vertigo modesta* is a new citation for the country.

### RESUM

#### Noves aportacions a la malacofauna de Catalunya

Hom dóna a conèixer noves dades de distribució geogràfica per a la malacofauna de Catalunya. *Vertigo modesta* se cita per primer cop per al Principat.

### RESUMEN

Se dan a conocer nuevos datos de distribución geográfica para la malacofauna de Cataluña. *Vertigo modesta* se cita por primera vez para Cataluña.

KEYWORDS: Molluscs, Gastropoda, Catalonia, geographical distribution

PALABRAS CLAVE: Moluscos, gasterópodos, Cataluña, distribución geográfica

En esta nota se dan a conocer nuevas citas de distribución geográfica para la malacofauna de Cataluña, así como el hallazgo de nuevas especies recolectadas por uno de los autores (F. R.) en el Ripollès.

Para la identificación de las especies encontradas se ha utilizado preferentemente el manual de KERNEY *et al.* (1983). En la lista faunística se señala la localidad con la cuadrícula UTM de 10 km de lado.

Fam. VERTIGINIDAE  
Subf. VERTIGININAE

*Vertigo (Vertigo) modesta* (Say, 1824)

Varios ejemplares vivos debajo de piedras en Núria (Ripollès) (2.000 m), en las proximidades de los pequeños cursos de agua que alimentan el curso superior del río Freser (20-IX-87) (F. Ramírez, leg.).  
U.T.M.: 31TDG3490.

\* Còrsega, 404. 08037 Barcelona.

\*\* Turó, 26. Can Joan. Montcada i Reixac. Barcelona.

Especie de distribución geográfica circumpolar holártica (en Europa la región ártica y alpina). Nueva especie para la fauna de Cataluña.

Fam. PUPILLIDAE

*Pupilla (Pupilla) triplicata* (Studer, 1820)

Un ejemplar recogido en Aigües-Ribes (1.200 m) (4-XI-87) (Ramírez, leg.), localidad cercana a Ribes de Freser (Ripollès). U.T.M.: 31TDG3489.

Citada por ALTIMIRA (1959, 1961, 1963) de la Mola de Coldejou (Baix Camp), del Mascar (Baix Ebre) y del Pedraforca (vertiente oriental) 1.800 m (Berguedà).

*Lauria (Lauria) sempronii* (Charpentier, 1837)

Varios ejemplares debajo de piedras en Núria (2.000 m), en el mismo hábitat que *V. modesta* y en la ermita de Sant Sadurní de Gallifa (Vallès occidental) (800 m), también debajo de piedras y en la parte superior de unos muros (8-IX-87) (F. Ramírez, leg.). U.T.M.: 31TDG2312.

Esta segunda y tercera capturas corresponden a ejemplares recogidos vivos, correspondiendo la primera captura a una concha vacía en los aluviones del río Fluvià en la Font de Sant Roc, Olot (la Garrotxa), en compañía de *L. cylindracea* (BECH & FERNÁNDEZ, 1984).

Fam. HELICIDAE

Subf. HELICELLINAE

*Xeroplexa arturi* (Haas, 1924)

Una concha vacía algo descolorida en Cubelles (el Garraf), Mas Trader (3-X-87) (F. Ramírez, leg.), recogándose además unos cuantos ejemplares de *Oestophora tarraconensis*. Se confirma así la cita de ALTIMIRA (1959) para la última de las especies mencionadas. U.T.M.: 31TCF8967.

Señalada por HAAS (1929) de los montes a ambos lados del Ebro inferior (Mont Caro, sierra de Cardó y sierra de la Mola de Tortosa). Citada por ALTIMIRA (1961) en la Mola del Caro; este autor señala ejemplares de gran tamaño, que llegan a alcanzar hasta 11 mm de diámetro. Los capturados por nosotros miden de altura 12,3 mm, y de diámetro mayor 12 mm.

Con dicha recolección se amplía hacia el N su área de distribución en Cataluña.

*Xerotricha (Castellana) parabarcinensis* (Zárate, 1946)

Cuatro conchas vacías algo descoloridas en Cubelles, Mas Trader (3-X-87) (F. Ramírez, leg.). U.T.M.: 31TCF8967.

Citada por VILELLA (1974) de las cercanías de Barcelona, y por GASULL (1974-75) de Valencia y Alicante. Con dicha captura se amplía hacia el S la distribución geográfica de dicha especie en Cataluña.

Subf. HELICINAE

*Pseudotachea splendida* (Draparnaud, 1801)

Dos ejemplares pertenecientes a la variedad *rosea* en Portbou (Alt Empordà) (17-VI-87) (F. Ramírez, leg.). U.T.M.: 31TEG1290.

Esta variedad fue citada por primera vez en Cataluña por ROMANÍ (1917) de Capellades (Anoia).

## BIBLIOGRAFÍA

- ALTIMIRA, C. 1959. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica de la provincia de Tarragona. *Misc. Zool.*, 1 (2): 89-95.
- ALTIMIRA, C. 1961. Notas malacológicas. Contribución al conocimiento de los moluscos terrestres y de agua dulce de Cataluña. *Misc. Zool.*, 1 (4): 19-28.
- ALTIMIRA, C. 1963. Notas malacológicas (con datos anatómicos debidos al Dr. Adolfo Ortiz de Zárate). *Misc. Zool.*, 1 (5): 15-26.
- BECH, M. & FERNÁNDEZ, G. 1984. Nuevos datos sobre la distribución geográfica de algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Cataluña. *Iberus*, 4: 91-97.
- GASULL, L. 1974. Una interesante localidad desaparecida de *Xerotricha (Castellana) parabarcinensis* Ortiz de Zárate del Llano de Barcelona (Moll. Pulmon.). *Bol. Soc. Hist. Nat. de Balears*, 19: 151-152.
- GASULL, L. 1975. Fauna malacológica terrestre del Sudeste Ibérico. *Bol. Soc. Hist. Nat. de Balears*, 20: 5-155.
- HAAS, F. 1929. Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. *Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, 13: 1-491.
- KERNEY, M. P., CAMERON, R. A. D. & JUNGBLUTH, J. H. 1983. *Die Landschnecken Nord-und Mitteleuropas*. Paul Parey. Hamburg und Berlin.
- ROMANÍ, A. 1917. Alguns moluscos de la comarca de Capellades. *Buill. Inst. Cat. d'Hist. Nat.*, 14 (4): 45-48.
- VILELLA, M. 1967. Notas malacológicas. IV. Nuevas citas de dispersión. *Misc. Zool.*, 2 (2): 17-21.