

## Dades malacològiques tarragonines

per

A. BOFILL i POCH

Amb motiu de l'excursió col·lectiva efectuada per la INSTITUCIÓ al camp de Tarragona, del 2 al 6 d'octubre del passat any 1921, fou recollit cert nombre de mol·luscos pels membres Srs. CODINA, FONT-QUER, R. P. NAVÁS, SAGARRA i l'autor d'aquesta nota, que ingressaren en el Museu de Catalunya, prèvia la determinació que dels mateixos vaig efectuar. Són aquests:

De la serra de l'Almusara: Mas dels Frares i avenc de la Febró (alt. uns 1000 m.); Salou i Cambrils:

*Hyalinia (Polita) lucida* Drap., que s'aproxima a la forma *farinesi* Bgt. —Mas dels Frares

*Hyal. (Polita) glabra harlei* Fag.—Id.

*Pyramidula (Pyramidula) rupestris* Stud.—Avenc de la Febró.

*Helix (Candidula) rugosiuscula monistrolensis* Fag.—Mas dels Frares.

*H. (Carthusiana) cartusiana* Müll., forma *elevata* (diàm. 10, alt. 6'50 mil.).—Id.

*H. (Pseudotachea) splendida* Drap., un exemplar amb les faixes 12345.—Avenc de la Febró.

*H. (Tachea) nemoralis* L., peristoma negre: 1 groc uniforme; 1 groc amb 12345, i 1 rosat uniforme.—Mas dels Frares.

*Id.*, peristoma negre: 2 groc uniforme, i 1 amb 12345.—Avenc de la Febró.

*H. (Cryptomphalus) aspersa* Müll.—Id.

*Id.*—Mas dels Frares.

*Chondrula quadridens* Müll.—Id.

*Pupa (Modicella) polyodon* Drap.—Id.

*Id.*—Avenc de la Febró.

*P. (Modicella) secale* Drap. —Mas dels Frares.

*Pupilla (Lauria) cylindracea* Da Costa.—Avenc de la Febró.

*Physa acuta* Drap.—Cambrils, parc Samà.

*Cyclostoma (Ericia) elegans* Müll.—Mas dels Frares.

*Littorina neritoides* L.—Salou.

*Monodonta turbinata* Born.—Id.

*Gibbula divaricata* L.—Id.

En S. NOVELLAS, recol·lector del Museu, en ses excursions per la regió tortosina, ha pogut aplegar els següents mol·luscos en juny de l'any susdit:

*Euconulus fulvus* Müll.—Ports de Tortosa: Fon del Rojal.

*Helix (Xerophila) arigonis* Rossm.—La Cènia.

*H. (Tachea) nemoralis* L., peristoma negre: 1 groc amb 12345, i 1 tot groc.—Ports de Tortosa, Mas de Carlades.

*H. (Eobania) vermiculata* Müll.—La Cènia.

*Chondrula quadridens* Müll.—Carlades.

*Pupa (Modicella) avenacea* Brug., forma denominada *dertosensis* per Bofill.—Id.

*Id.*—De Mas de Barberans a la Cènia.

*Lymnaea (Galba) truncatula* Müll.—Id.: id.

*Cyclostoma (Ericia) elegans* Müll.—Ports de Tortosa: Font del Caragol.

*Id.*—Id: Font del Rojal.

El propi Sr. NOVELLAS ha recollit en Espluga de Francolí:

*Helix (Pseudotachea) splendida* Drap.: 16 exemplars, des dels privats de faixes, fins als amb 12345; abundant els de les faixes puntejades, menys la 3, que és contínua. Alguns són més o menys rosats.

*H. (Tachea) nemoralis* L.: peristoma negrenc. Olivacis: 1 uniforme; 2 amb vestigis de 5 faixes, que s'accentuen cap al peristoma; 2 amb 1 (23) 45; 1 amb 00100.

*H. (Archelix) punctata* Müll.—3 exemplars.

*Rumina decollata* L.—1 exemplar poc decollat: alt. 40, diàm. 10 mil.

*Lymnaea (Galba) limosa* L.—forma típica. — 30 exemplars.

*L. (Stagnicola) palustris* Müll.—12 exemplars.

*Ancylus simplex* Buch.—125 exemplars.

*Cyclostoma (Ericia) elegans* Müll.—16 exemplars.

El Director del Museu, Dr. FONT QUER, ha trobat en març de l'esmentat any 1921, les dugues espècies següents, en La Riba, conca del Francolí:

*Helix (Chilostoma) cornea* Drap., var., 1 exemplar de diàm. 17, alt. 8 mil. Si bé mort, s'hi reconeixen vestigis de les faixes.

*H. (Cryptomphalus) aspersa* Müll.—Un exemplar de diàm. 40, alt. 35 milímetres.

---

Ademés cal fer esment de dos exemplars donats al Museu de Catalunya per el Sr. PALOU, recollits per éll en Albinyana (Penadés), en abril de l'any 1912, de

*Helix (Archelix) alonensis* Fér., amb tres faixes bastant aparents i les demés ben marcades (diàm. 36, alt. 27 mil.).

Assegura el Sr. PALOU que no escasseja en la localitat, on l'han re-trobada viva en diferents ocasions.

Barcelona, 30 març de 1922.