

- Aristus sphaerocephalus*, Oliv.  
*Attagenus piceus*, Oliv.  
 \**Axinotarsus tristis*, Perris.  
*Brachycerus barbarus*, L.  
 \**Brachynus bœticus*, Ramb.  
*Cassida vittata*, F.  
 \**Cerambyx heros*, L.  
*Cetonia aurata*, L.  
 \**Chalcoides helsines*, L., var.  
     *jucunda*, Ws.  
 \**Chlœnius bœticus*, Ramb.  
*Cicindela campestris*, L.  
     — *maura*, L.  
*Cionus Olivieri*, Rosenh.  
*Cleonus nigrosuturatus*, Goeze.  
 \**Clythra læviuscula*, Ratzb.  
*Coccinella 7-punctata*, L.  
*Coptocephala floralis*, Oliv.  
*Cryptocephalus pygmaeus*, F.  
 \* — —  
     var. *amœna*, Drap.  
 \**Cryptocephalus rufines*,  
     Goeze.  
*Cryptocephalus 6-pustulatus*,  
     Rossi, var. *emissa*, Weise.
- Dasytiscus nigropilosus*, Reitt.  
 \**Dorcadion Lorquini*, Fairm.  
*Ebæus collaris*, Er.  
*Exochomus flavipes*, Thunb.  
*Gonocephalum pusillum*, F.,  
     var. *meridionalis*, Küst.  
*Gymnopleurus flagellatus*,  
     Fab.  
*Gymnopleurus pilularius*, L.  
 \**Halyzia 14-punctata*, L. var.  
     *tessulata*, Scop.  
*Halyzia 22-punctata*, L.  
 \**Harpalus honestus*, Duft.  
     — *psittaceus*, Fourer.  
 \* — *rubripes*, Duft., var.  
     *sobrina*, Dej.  
 \**Harpalus serripes*, Schh.  
*Henicopus praticola*, Waltl.  
*Hoplia aulica*, Ill.  
*Hylotrupes bajulus*, L.  
 \**Lachnœa tristigma*, Lac.  
     — *paradoxa*, Oliv.  
     var. *vicina*, Lac.  
 \**Lagria lata*, Fabr.  
*Lampyris noctiluca*, L.

RVND. P. LONGINOS NAVÁS, S. J.

(Seguirá.)

## Sobre «Cicindelas» de Catalunya

Fa varis anys que en les excursions que fem ab el nostre company en J. de Aguilar-Amat al Besòs, venim trobant, en la part dreta de la mateixa desembocadura, una nombrosa remada de *Cicindelas* pertanyents a l'especie *paludosa*, Du-four.

Un cop a casa, y després d'examinar-les detingudament, hi hem observat sempre la presència d'interessants varietats,

aixís com també una, qual tipo s'aparta molt de la *paludosa*, Duf., ab quina especie l'han confosa alguns entomòlechs y que ha resultat esser la *germanica* var. *catalonica*, Beuthin.

Faltats d'obres especials pera poder determinar ab exactitut les mentades varietats, varem determinar enviar-les, pera llur estudi, al distingit entomòlech alemany y especialista en *Cicindelas* el Dr. H. Beuthin, d'Hamburg, el qual va contestar-nos que les enviades eren les següents:

*Cicindela paludosa*, Dufour.

» » var. *Hopffgarteni*, Beuthin.

» » var. *viridis*, Beuthin.

» *germanica*, var. *catalonica*, Beuthin.

Posteriorment, en virtut d'uns articles publicats pel mateix Dr. Beuthin en l'*Entomologische Nachrichten* titulats *Ueber Varietäten palaearktischer Cicindelen* que ha tingut l'amabilitat d'enviar-nos, hi hem trobat, a més de les anteriors, les dugues següents varietats:

*Cicindela paludosa*, var. *scalaris*, Dejean (var. *Dufouri*, Beuthin).

*Cicindela paludosa*, var. *sabulicola*, Walf. (var. *Baui*, Beuthin).

Hauriem donat aquí alguns croquis y descripcions d'aquestes *Cicindelas* a fi d'ajudar als nostres companys en la tasca de classificació de les formes catalanes. No ho fem perquè probablement el mateix Dr. Beuthin honrarà les planes d'aquest BUTLLETÍ ab la descripció d'aquestes y altres varietats descobertes a Catalunya y anomenades per ell per primera vegada.

L'època en que aquestes *Cicindelas* comencen a aparèixer és el mes de Maig, sent a últims de Juny y primers de Juliol els dies en que més abunden y en que efectuen la còpula, començant després a disminuir progressivament fins a últims de Juliol, en que ja no'n queda rastre.

De totes aquestes, la més abundant és la var. *Hopffgarteni*, sent la *germanica* var. *catalonica* la més escassa.

Pera acabar direm, a tots els que vulguin fer-ne un bon arplech, que hi vagin a últims de Juny y a quarts de cinch del matí, puix més tard el sol comença ja a picar, sent penós agafar-ne regular nombre, per lo molt que fan córrer.