

Com se pot veurer, son trentasis les espècies que vaig capturar sense contar els *micros* y tenint en compte que d' algunes vaig agafarne set ó vuyt exemplars y que la excursió fou feta molt de pressa, sense podernos entretindrer en cassar molt; y afeigint á n' aixó lo primerench del temps, pot deduirse la riquesa de la fauna lepidopterològica de la encontrada.

UNA ORQUÍDEA NOVA

per el

DR. D. JOAN CADEVALL

En l'^e excursió que 'l dia 6 de Maig de 1903 efectuarem ab el senyor Ferrer á Montserrat, el R. P. Adeodat Francisco Marçet, que ab ver entussiasme estudia la Flora d' aquella incomparable montanya, me presentá una Orquídea que de prompte y no sens algún dupte referí al *Ophrys scolopax* Cav.; mes estudiada després aquella planta ab la deguda detenció, puguí apreciarli diferencias, á mon entendre bastants, pera considerarla com especie nova. D' ella y d' alguna altre planta 'n donguí compte á la Reyal Academia de Ciencias y Arts de Barcelona, en una nota que fou oportunament llegida y que per excés de material no s' ha publicat encare. Y com que 'l diferir per més temps sa publicació podría redundar en perjudici de la corresponent prioritat, me decideixo á remetre á l' Institució la descripció d' aquesta orquídea (sentint no poguer incloure 'l dibuix per no habermen quedat copia), per si creu d' interès donarla á coneixer als seus lectors.

Ophrys montserratensis Cad. sp. nov.

Foliis oblongis; floribus laxe spicatis, bracteis herbaceis, ovarium superantibus; tepalis exterioribus cruciato-patentibus, roseis viridi-nervosis; interioribus mediocribus, roseis

subglabris; labello basi trilobo, lobis lateralibus triangularibus, revolutis, semicirculum basi desribentibus, velutinis purpureis, obscuriori apice obtuso superficiem labelli non superantibus; lobo medio semieliptico, margine revoluto, purpureo velutino, in medio macula glabra duabus lineis longitudinalibus connectis altera anteriori sinuosa, constituta; in apice, vi-ridi-flavo, brevi, semicirculari appendice recurvato. Gymnostemio arcuato, brevi et leviter rostrato.

Differt a *O. scolopax* Cav., cui valde similis, tépalis 2 interioribus longioribus, duplo latis; labelli lobo medio latiori, breviter appendiculato; lateralibus obtusis, non cornutis, apice obscuriori superficiem labelli non superantibus.

Floret Majo.

In nemorosis Montserratí P. Adeodatus F. Marçet legit.

Tarrassa, 15 d' Abril de 1904.

SECCIO BIBLIOGRÀFICA

Obres y publicacions rebudes pera la Biblioteca

REVISTAS

Razón y Fe, Tomo VIII, núm. 4, y IX, núm. 1. (Abril-Mayo, 1904)

Bulletin du Musée Océanographique de Mónaco, núm. 9.

Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, números 3 y 4. (1904).

Revista Científica Profesional, núm. 2, (1904).

Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Mars y Abril de 1904.

Miscellanea entomologica, núms. 10, 11, 12, vol. XI.

El Colmenero Español, núms. 148 y 149.

Broteria, Vol. III (1904), fasc. I, II y III.