

CONTRIBUCIÓ AL ESTUDI
DE LA FAUNA LEPIDOPTEROLOGICA
DE TARRASSA
PER
DON DOMINGO VENTALLÓ

No es la llista de les espècies que á continuació presento un estudi complert dels Lepidopters de la localitat, puig principalment es aqueixa fruyt de algunes excursions fetas durant los dos ultims estius. Sens dubte se citaran moltes d' altres espècies; algunas que no he trobat estan ja citadas en la llista de Lepidopters que en un Butlletí passat publicà nostre consoci Sr. Maluquer (Salvador). Durant la primavera y la tardor tenen de trobarse altres espècies que observadors mes intel·ligents podrán determinar y en las mateixas époques en que he cassat poden trobarse en altres punts de la localitat. No cito las que he vist volant, solsament aquelles de las que n' he pogut tenir exemplars. (1)

RHOPALOCERA

I. Papilionidae

Papilio Podalirius L., var. *Feisthamelii* Dup.

» *Machaon* L.—Oruga sobre l' *Foeniculum vulgare*.
Abundant á Can Palet.

II. Pieridae

Pieris brassicae L.—Oruga sobre la *Brassica oleracea*; comú per tot arreu.

» *rapae*. L.
» *daplidice* L.

Anthocharis Belia Cr., var. *Ausonia* Hb.

Leucophasia sinapis L.—Abunda á Can Aurell, sobre l' *Cistus albidus*, etc.

Colias edusa Fabr.

» » var. *Helice* Hb.—Trovada á can Aurell al comens del estiu.

Gonopteria rhamni L.—Comú per tot arreu, especialment la ♀.

» *Cleopatra* L.

(1) Alguns determinats per l' abbé J. de Joannis, rue Coetlogon, 7, Paris.

III. Lycaenidae

Thestor Ballus Fabr.—Durant la primavera, se trova molt abundant à can Aurell.

Polyommatus Phœas L.

Lycaena Icarus Rott.

» » var. Icarinus Scriba

» Corydon Poda.

» Astrarche Bgstr.

VI. Apaturidae

Charaxes Jasius L. Orugas abundants à can Amat, durant l' hivern.

VII. Nymphalidae

Vanessa urticae L.

» antiopa L.

» atalanta L.

» cardui L.

Melithea didyma O.

IX. Satyridae

Melanargia lachesis Hb.

Erebia medusa Hb.

Satyrus Statilinus Hufn,

Pararge Megaera L.

Epinephele janira L.

Coenonympha pamphilus L.

X. Hesperiidae

Adopaea Acteon Rotten.

» Thaumas Hufn.

Thanao Tajes L.

Augiades Sylvanus Esp.

Hesperia Sao Hb.

Carcharodus alceae Esp.

HETEROCEA

SPHINGES L.

I. Sphingidae

Acherontia atropos L.

Sphinx Convolvuli L.—Cap al vespre molt abundant en las plantas floridas dels jardins. v. gr.: *Lonicera*, etc.

- Deilephila Euphorbiae L.—Orugas á can Poal, sobre la *Euphorbia characias*, á l' estiu.
 » elpenor L.—Abunda al vespre.
 » lineata Fabr.—Abunda com l' anterior al vespre.
 Macroglossa stellatarum L.—Orugas abundantíssimas sobre 'ls *Galium* dels costats de la vía férrea, y á can Anglada. Agost y Setembre.

III. Arctiidae

- Callimorpha Hera L.
 Coscinia striata L.

XIII. Notodontidae

- Thaumatopaea pityocampa Schiff.—A can Montllor.

NOCTUAE

- Bryophila muralis Forst.—Travada en una olivera, en el camí de can Palet.
 Triphaena pronuba L.
 Agrotis saucia Hb.
 » crassa Hb.
 Mamestra brassicae L.
 Polia xanthomista Hb.
 Hadena secalis L.
 Brotolemia meticulosa L.—Orugas per la tardor, sobre la *Calendula arvensis*.
 Leucania unipuncta Harr.
 Caradrina ambigua Fabr.
 Plusia gamma L.—Orugas sobre las *Brassica*, *Lonicera*, etc., ab las dos especies següents.
 » chalcytes Esp.
 » aurifera Hb.
 Acontia luctuosa Esp.
 » lucida Hufn.
 » » var. albicollis Fabr.
 Talpochares candidana Fabr.
 » pura Hb.
 » parva Hb.
 Metoptria monogramma Hb.
 Leucanitis stolida Fabr.
 Grammodes algira L.
 Herminia crinalis Tr.

Hypena lividalis Hb.—Tan aquesta especie com la següent,
s'agafa picant els feixos de llenya, y en els quartos
foscos de las casas.

» *obsitalis* Hb.

GEOMETRAE

Thalera fimbrialis Scop.

Acidalia ochrata Scop.

» *dongaria* Ramb.

» *aversata* L.

» *subsericeata* Hw.

» *imitaria* Hb.

» *ornata* Scop.

» *virgularia* Hb.

» *rubiginata* Hufn.

» *marginepunctata* Goeze.

» *litigiosaria* Boisd.

» *rufaria* Hb.

Ephyra pupillaria Hb.

Pachycnemia hippocastanaria Hb.

Gnophos mucidaria Hb.

» *variegata* Dup.

Aspilates ochrearia Rossi.

Aplasta ononaria Fuesl.

Sterrhia sacraria L.

Anaitis plagiata L.—Trovada sobre la *Hedera helix*.

Tephroclystia pumilata Hb.

Phybalapteryx polygrammata Bkh.

» *corticata* Tr.

Larentia Salicata Hb.

PIRALIDINAE

I. Pyralididae

Cledeobia angustalis Schiff.

Actenia brunealis Tr.

» *borgialis* Dup.

Hypotia corticalis Schiff.

Aglossa cuprealis Hb.

Asopia farinalis L.

Pyralis lienigialis Zell.

Herculia glaucinalis L.

Endotricha flammealis Schiff.

Scoparia angustea Stph.

- Noctuelia floralis Hb.
 Phlyctaenodes palealis Schiff.
 » nudalis Hb.
 » sticticalis
 Cyneda dentalis Schiff.
 Tegostoma comparalis Hb.
 Mecyna polygonalis Hb.—Orugas sobre l' *Ulex parviflorus*.
 Pyrausta nubilalis Hb.
 » sanguinalis L.
 » aurata Scop.
 » cespitalis Schiff.
 Sylepta ruralis Scop.
 Nomophila noctuella Schiff.
 Pionea ferrugalis Hb.—Abundant sobre l' *Erygnium campestre*.
 Antigastra catalaunalis Dup.
 Stenia bruguieralis Dup.

IV. Crambidae.

- Ancylolomia tentaculella Hb.
 Crambus sp.
 Oxybia transversella Dup.
 Salebria semirubella Scop.
 Ancylosis cinnamomella Dup.
 Homoeosoma sinuella Fabr.
 Ematheudes punctella Tr.
 Ephestia Kuehniella Zell.
 » Tephritisella Led.
 » sp. nov?
 » elutella Hb.

TORTRICINAE

- Tortrix pronubana Hb.
 Olethreutes urticana Hb.
 Euxanthis meridiana Stgr.
 Cacoecia semialbana Guenée.

TINEINAE

II. Atychidae

- Atychia sp.

III. Talaeporidae

- Solenobia sp.

V. Tineidae

Tinea fuscipunctella Harr.

XIV. Gelechidae

Blastobasis Phycidella Zell.

XVII. Coleophoridae

Coleophora sp.

PTEROPHORINA

Pterophorus monodactylus L.

Stenoptilia sp.

Tarrassa, Abril de 1905.

ESPÈCES NOUVELLES D' HYMÉNOPTÈRES
DE CATALOGNE

PAR

J. PÉREZ

professeur à l'Université de Bordeaux

MELLIFÈRES

CROCISA DIVISA.

♀ Long. 10 mm. Voisine de la *C. major*. Dessins semblables, les taches du corselet un peu diminuées; pinceau sous-cutellaire très long et dédoublé; un très petit nombre de poils blancs au dessus de l'angle médian; côtés du labre, base des mandibules ornés d'un duvet blanc, barbe de ces dernières blanche; aux pattes postérieures, tous les tarses tachés de blanc en dessus.

Antennes beaucoup moins robustes, proportions relatives des articles semblables. Écusson sensiblement plus court, sa longueur médiane à peu près égale à la demi-largeur de la base (*major*, évidemment plus grande). Échancrure postérieure presque en arc de cercle, de courbure moindre; angles