

COMUNICACIONS

NOTAS PERA LA «FLORA MONTSERRATINA»

PE'L

R. P. ADEODAT MARCET, O. S. B.

II

RECTIFICACIÓ

HIERACIUM VIRGINEUM Marcet.—HIER. MARIANUM Pau

Ans de continuar la publicació de las plantas montserratines dech fer una rectificació en el nom de una de las espècies novas del genre *Hieracium* donadas á coneixer en la primera de mas *Notas pera la «Flora montserratina.»* (But. de l' Instit. Cat. d' Hist. Nat. Seg. ép. any II, n.^o 5). Allí vaig publicar un *Hieracium* al qual el Sr. Pau á instancias mevas doná lo nom de *H. Marianum*.

Posteriorment me comunicá mon apreciat amich que ja existia un altre espècie del mateix genre ab el susdit nom: en efecte, Willdenow publicá (Sp. pl. t. III, part III, p. 1572), una espècie nova de Pensilvania (habitat in America boreali, diu solzament en Willdenow) ab la denominació de *Hieracium Marianum* Willd. Axís es que, á fí de que no 's confonquin aquellas dugas espècies, proposo pera la planta montserratina lo nom específic de *Virgineum*; d' aquest modo s' evitará la confusió y equivocació que podría donarse d' aquellas dugas espècies diferents y de tan distinta localitat, salvantse al mateix temps la ofrena que de nostra espècie nova férem á la Verge Inmaculada, Regina de las flors.

Feta aquesta rectificació, vaig á donar la diagnosis de algunes plantas novas trobadas l' any passat á Montserrat.

III

PLANTAS NOVAS

HIERACIUM PRIMULIFOLIUM Pau

(e Sect. *Vulgatarum* Fr.)

«*Planta humilis, subacaulis; pedunculis radicalibus 3-5 c. m. foliorum petiolo 14 c. m. limbo elliptico, obtuso, subden-*

tato, basi aliquantulum attenuato; pedunculis villosis; anthodio terracei coloris; squamis pubescentibus, linea pilosa nigra ad dorsum munitis, obtusiusculis; ligulis glabris; stillis pallidis.»

«Habitat in Monteserrato apud Sacellum Divi Joannis.»

«Legit P. Adeodatus Marcet die nona Julii 1905.» (C. Pau in litt.)

HIERACIUM STENOPHYLLUM Pau

«Simile *H. murorum* L. Differt tamen ab eo foliis perangustis, dentatis, inferne, laciniatis, laciniis falciformibus, superne ad tertiam usque limbi partem integris, apice cuspidiatis, basilaribus autem foliis apice rotundatis et mucronatis; caule 2-5 floro; anthodio piloso; pilis albis et nigris; squamis longe cuspidatis; ligulis glabris; stilis pallidis.»

«P. Ad. Marcet legit die 28 Maii 1905 in Monteserrato, juxta viamquæ dicit ad S. Hieronimum in loco *Plá dels escorsos*, vulgo dicto» (C. Pau in litt.)

HIERACIUM STENOTRICUM Pau

«Foliis angustis, lanceolatis, amplexicaulibus, oblongis, longe cuspidatis; caule monophyllo; pedunculis et anthodio hispidis, pilis longis; bractœis protractis; squamis nigris, inglandulosis, cuspidatis; stigmate subatro.»

«Forma media inter *H. vulgatum* et *purpurascens*. An *H. vulgatum* × *purpurascens*?»

«Legit P. Ad. Marcet prope fontem *del Llum* dictam in umbrosis Montiserrati die 18 Maii 1905.» (C. Pau in litt.)

CONOPODIUM MARIANUM Marcet

Planta glaberrima: tuberculo irregulare; caule flexuoso 20-40 c. m., striato, glabro, parum ramoso; foliis radicalibus bisternatisectis, segmentis longe petiolatis, tripartitis; segmentis extremis trilobatis, lobis oblongis, apice rotundatis; foliis caulinis sersilibus, semiamplexicaulibus, profunde divisionis; segmentis longis, linearibus, mucronatis; umbellis 3-5 radiatis, radiis inæqualibus, gracilioribus; umbellulis 8-10 floribus, radiis duplo vel triplo longioribus fructu; involucro ac

involucellis caducis, mono vel biphyllis; achoniis ovatis, nigro-virentibus; stilopodio conico tertiae parti fructus æquanti; stilis stilopodio duplo majoribus, parallelis, a medietate leviter arquatis externe.

Valde proximum *C. thalictrifolium* Boiss., sed foliis *Fumariae confusa* Jord. et stilis minoribus differt. A *C. denudato* K. foliis omnibus apice rotundatis, caulinis 3-5 fidis; laciiniis superne latioribus. A *C. ramoso* Costa segmentis foliorum longioribus, latioribusque, et maxime, stilis parallelis, leviter arquatis, non reflexis.

Videtur forma inter *C. denudatum* K. et *C. thalictrifolium* Boiss.

Habitat in Monteserrato juxta torrentem *dels Avellaners* ubi legi die 9 Julii 1905 cum floribus et fructibus.

Ab quant de gust y satisfacció dedico aquestas mevas *pirmicias botánicas* á María Santíssima, com á insignificant mostra de lo que li aprecio lo haberme tingut desde ma infancia baix son mantell de Mare en aquest sèu trono majestuos de rocas y núbols, sols Ella ho sab que veu lo cor agrahit del últim dels sèus patjes.

ACER PAU Marçet

(*A. ITALUM Marçet MONSPÈSSULANUM* Pau, in litt.)

Acer foliis coriaceis, supra nitidiusculis, subtus albidis, glabris, nerviis secundariis valde reticulatis, ellipticis, basi cordatis, trilobatis, lobis lateralibus pene in angulo recto cum mediano, laxe dentatis, obtusis: corimbo erecto 4-6 floro; pedunculis glabris, debiliter striatis; samaris glabris, inflatis ad basim alarum: alis semiobovalibus, unde divaricatis ora externa, et parallelis interna apparentibus.

Affine *A. Italo*, sed foliis trilobatis, lobis divergentibus, et sicut latioribus quam longis ab eo optime secernitur; ab *A. monspessulanus* forma foliorum et samaris erectis differt.

Habitat in Monteserrato ubi in via ad *Maganell* legi cum fructibus die 1 Junii 1905.

Me complasch en dedicar aquesta especie al eminent botanich espanyol En Carlos Pau, en testimoni de vera amistat.

Montserrat, Janer de 1906.