

notar á mès que l' indret de la trovalla enlayrat sobre d' un barranch, ab la terra somoguda; encare que no voltat de jardins, es altrament propici pera que llavors arrossegades per lo vent ó transportades per altre causa accidental, hi trobin un medi favorable á la germinació, puguin desenrotllarse fins obtindre la perfecció corresponenta á la sèva propia especie.

Ara sols interessa observar en anys vinents si lo *Porophyllum* apareix normalment en eixa ó en properes encontrades, poguen assegurar que 'n es especie sub-espontania, ó bè que s' en es fet espontania. A les hores entraria eixa especie á augmentar lo nombre de les que constitueixen la nostra Flora.

Sarriá.—Col·legi de Sant Ignaci.—Decembre 1905.

MOLUSCHS MARINS DE CATALUNYA

PER

D. JOSEPH MALUQUER Y NICOLAU

I

CEFALÓPODS

Ordre 1er., ACETABULÍFERS.—Sub-ordre I, OCTÓPODS.

Familia I, OCTOPIDAE

1. Gen. *Octopus* Lamarck

1. *Octopus vulgaris*.—Lamarck.

n. v., *pop.*

Abunda en tot el litoral, en las anfractuositats de las rocas. Es comestible, pero no molt apreciat.

2. *Octopus macropus*.—Fischer.

n. v., *pópara*.

No es tan comú com l' anterior, vivint en las mateixas condicions, com lo majoria dels Octópod. Es poch apreciat. Salou. Barcelona. Blanes.

Fam. II, TREMOCTOPIDAE

1. Gen. *Parasira* Steenstrup

1. *Parasira carena*.—Verany. (*Philonexis tuberculatus* Risso).

Molt raro. A primers de Maig de 1905, un pescador va portar á la INSTITUCIÓ CATALANA D' HISTORIA NATURAL un bon exemplar ♀, pescat en la rada de Barcelona.

Fam. III, ELEDONIDAE

1. Gen. *Eledona* Leach

1. *Eledona moscata* Lamarck.

n. v., *pop pudent*, *pop mesquer*.

Comú en tot el litoral, essent sa carn molt poch apreciada pe 'l fort olor á mesch que despedeix. Salou. Barcelona. Mataró. Blanes, etc.

2. *Eledona Aldrovandi* Rafinesque.

n. v., *pop blanch*, *pop manyuflá*.

Menys comú, pero un xich més apreciat, per l' ausencia del olor característich de la *E. moscata*. Barcelona. Masnou. Blanes.

Fam. IV, ARGONAUTIDAE

1. Gen. *Argonauta* Linneo

1. *Argonauta Argo* Linneo.

Bastant raro. Se trovan algunas closcas d' aquesta hermosa especie en nostra costa, després dels temporals d' hivern y tardor, especialment en l' Ampurdá, Rosas, Cadaqués, Sant Feliu de Guixols, etc. Se 'n han trovat també en la platja de Can Tunis y desembocadura del Llobregat.

Sub-ordre II, DECÁPODS

Fam. V, LOLIGIDAE

1. Gen. *Loligo* Lamarck.

1. *Loligo vulgaris* Lamarck.

n. v., *calamars*.

Abundant en tota la costa, essent molt buscat, pe 'l preu alt que te en els mercats.

2. Gen. *Teuthis* Schneider.1. *Teuthis subulata* Lamarck.n. v., *calamarsó*.

També es molt comú, y com l' anterior molt apreciat per sa carn.

Fam. VI, SEPIOLIDAE

1. Gen. *Sepiola*, Leach.1. *Sepiola Rondeleti* Gesner.n. v., *morralets*.

Molt comú. Els pescadors se serveixen d' aquest molusch com esquer. Salou. Barcelona. Mataró. Blanes., etc.

Fam. VII, SEPIIDAE

1. Gen. *Sepia* Linneo.1. *Sepia officinalis* Linneo.n. v., *sípia*.

Molt abundant, y apreciat per sa carn excel·lent. Se pesca en tot el litoral, de Febrer á darrers de Maig, y també durant la tardor.

2. *Sepia rupellaria* d' Orbigny. (*S. biserialis* Fischer).

Bastant raro. Salou. Tarragona.

3. *Sepia Orbignyana* Ferussac. (*S. elegans* Verany).n. v., *sipions, castanyó*.

Molt comú en tota la costa, y bastant apreciat. També s' usa pera esear els aparells de pesca, com la *Sepiola Rondeleti*.

NOTAS LEPIDOPTEROLÓGICAS

POR D. FELIP FERRER Y VERT

I

Especies del género «Erebia»

Ab las notas publicadas fins are respecte del género *Erebia* no s' ha pogut formar més que una idea molt limitada de l' importancia que aquestas *rhopaloceras* pugan tenir á Cata-