

## Nouveaux coleopteres de la Catalogne et de Baleares

par le

DR. HENRY NORMAND

Fam. STAPHYLINIDAE

*Sipalia Española* nov. sp.

*Ferruginea, abdominis quarto segmento nigrescente. Pronotum basi medio prolongatum.—Masculus.—Elytra simplicia, abdominis quintum segmentum extremitate spinula angusta ornatum.* Long.—Cira 2 mill.

**R**oux-ferrugineux avec le 4e. segment visible de l'abdomen rembruni et les palpes, les pattes et les premiers articles des antennes testacés.

Tête, brillante, lisse, avec quelques points épars, aussi longue que large, presque sphérique; yeux très petits, quatre fois plus courts que les tempes. Antennes à trois articles basaux allongés, le 1er., un peu plus long et à peine plus épais, le 4e. carré, les suivants transverses, augmentant insensiblement de largeur, 10e. également transverse mais un peu plus long, 11e. cylindrique, conique à l'extrémité et plus long que les deux précédents réunis.

Corselet aussi long que large, plus large que la tête, retreci en avant et en arrière à partir de son quart antérieur, ponctuation obsolète et peu serrée, pubescence flave courte et couchée; sommet arrondi; bords finement rebordés, ornés de 4 à 5 cils, légèrement arrondis. Angles antérieurs arrondis, obtus, défléchis, non visibles de haut; postérieurs non perceptibles, complètement arrondis, se continuant avec la base dont les parties latérales se dirigent obliquement en dedans et en arrière pour se terminer sur la ligne médiane par un angle obtus mais accusé s'avancant au-dessus, de la base des élytres.

Élytres fortement transverses, un peu plus larges que le corselet et près de deux fois plus courts, couverts d'une ponctuation granuleuse, fine, assez serrée; épaules arrondies; extrémité coupée droit; bords sensiblement parallèles.

Abdomen parallèle, brillant, à fond imperceptiblement alutacé, ponctuation fine, clairsemée.

Mâle.—Corselet à angle basal nettement mucroné et un peu surélevé; 5e segment abdominal portant au bord postérieur de sa face dorsale une épine fine, acérée, redressée et dirigée un peu obliquement en arrière.

rem que la vomités, encara, amb poca o molta vida. L'altre exemplar el posàrem en alcohol en entrar el fred.

Creïem que, a no tardar, podrem donar una major abundància de cites d'aquesta espècie que mereix ésser estudiada detingudament. Actualment en coneixíem només una cita del Dr. Boscà.

### **Lacerta viridis** Laur. (fig. 3)

Finalment donarem extensió a una nota apareguda en el número 8-9, vol. XXXIII, 1934, del BUTLLETÍ DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL, en què Sagarra, parlant de la presència de la *Lacerta viridis* a Viladrau, diu així:

«Del Montseny al Pireneu hi ha una solució de continuïtat en l'àrea de *L. viridis*. Es, doncs, interessant conèixer, del Pireneu ençà, les darreres petges de la faixa pre-pirenenca.»

Després de donar una cita de Vidrà, acaba així:

«A les Guilleries no l'hem trobada mai.»

Pel juny del 1936, passant pel «rierab» de Fàbregues (Riera major) de Sant Sadurní d'Osormort, ens donàrem compte que s'escorria lentament per un forat, una cua que ens cridà l'atenció per la seva llargada en comparació amb el seu gruix; a la poca estona d'excavar amb el ganivet de butxaca, aparegué a la nostra vista un malaltís *Lacerta viridis* amb una nafra al coll, encara no ben cicatritzada.

Portat al terrari, li férem alguns tocs de tintura de iode en la dita nafra i en pocs temps va fer vida comuna amb els seus congèneres, *Lacerta ocellata*; però abans d'entrar a l'hivern, morí.

\*

\*\*

Acompanyem la vista superior del cap, de cada una d'aquestes interessants espècies que hem trobat, amb el fi que a tothom que li interessin pugui fer comparacions.

Hem de remarcar el gràfic del *Coluber longissimus*, el qual és quelcom més estret que no el dóna Boulenger.

També és de remarcar la curiosa forma de l'escut parieto-occipital de la *Lacerta viridis*, la qual dóna una petita deformació a la zona de contacte d'aquell amb l'occipital. Són, igualment, quelcom deformats els supraoculars, degut a una diferent inclinació de la seva línia divisòria.

Cette espèce pourrait se placer près de *S. spinicollis* Kr. dont elle se distinguera par sa taille plus petite, sa ponctuation obsolète, son abdomen plus clair et enfin par les caractères sexuels du mâle dont les élytres sont simples et l'épine du 5e segment abdominal bien plus étroite.

Espagne.—Deux exemplaires capturés à Berga (Catalogne) par Mr. Español, Types in coll. Español et Normand.

#### **Astenus lepidulus** nov. sp.

*Niger, elytrorum extremitate breviter marginata, antennis tibiisque piceis fronte valde convexa, elytrorum humeris nullis, abdomine ad extremitatem latiore.* Long. 3-3'5 mill.

Noir, avec un fin liseré jaunâtre à l'extrémité des élytres, antennes et tibias bruns de poix, tarsi testacés; pubescence brune, couchée, plus longue à l'abdomen.

Tête rugueuse presque aussi large que longue, couverte d'une ponctuation confluyente ovulaire et ocellée; front fortement convexe; yeux aussi longs que les tempes qui sont arrondies; antennes à articles allongés, analogues à celles de l'*A. angustatus* Payk.

Corselet plus étroit que la tête et que les élytres, ponctué aussi densément mais moins fortement que la tête, un peu plus long que large, largement ovulaire, avec son maximum de largeur au tiers antérieur où il présente cinq ou six cils raides et foncés.

Elytres aussi larges que longs, plus étroits que la tête mais plus larges que le corselet, rétrécis à la base où les épaules, à peine sensibles, sont fortement arrondies. Ponctuation rugueuse, disposée en séries transverses, irrégulières.

Abdomen convexe, s'élargissant à l'extrémité. Fond des téguments lisse avec, sur chaque segment, 3 ou 4 rangées transversales et ondulées de fins granules confluentes. Trois premiers tergites sillonnés à leur base, le 5e presque deux fois plus long que le précédent.

Cette espèce appartient au groupe de l'*A. angustatus* Payk. mais y tient une place absolument à part par ses élytres courts, à épaules arrondies et peu marquées.

Espagne.—Baléares, Ile d'Ibiza. 2 femelles capturées par Mr. Español (nov. 1935). Types in coll. Español et Normand.

### **Fam. PSELAPHIDAE**

#### **Faronus Españolii** nov. sp.

*Rufo-testaceus, caput triangulare, oculis magnis, frontis sulco Augusto; thorax lateraliter foveola unica ornatus; elytrorum stria dorsalis obliqua, intus directa.*

*Masculus*.—*Oculi majores, thorax latior, elytra breviora; pedes crassiores. Abdominis quintum ventrale segmentum extremitate introrsum incurvatum, ultimum segmentum in medio convexum.* Long: 1'5 mill.

Taille de *F. nicaeensis* Saulc.; roux ferrugineux avec les antennes et les pattes testacées.

Tête bombée, en triangle isocèle, éparsément mais nettement ponctuée, antennes assez longues, article basilaire, épais, cylindrique, deux fois plus long que large; 2, ovalaire, un peu plus étroit; 3, sphérique, plus petit que tous les autres articles; 4 et 6 arrondis; 5, plus gros, un peu ovalaire; suivants formant une massue à peine marquée; 10, fortement transverse; 11, conique, plus petit que les deux précédents. Sillon frontal étroit; tempes, triangulaires, prolongées en dehors et rebordées à leur extrémité. Yeux gros, proéminents, plus grands que les tempes.

Corselet convexe, transverse avec une seule fossette latérale, impression médiane en forme de lyre quadrangulaire, à base formée d'un sillon profond, lisse, triponctué et branches bien marquées, à extrémités biconduées et parfois recourbées en dehors. Côtés, arrondis dans leur moitié antérieure, rétrécis en arrière et sinués au niveau de la fossette postérieure. Angles postérieurs obtus, base droite.

Élytres transverses, un peu plus courts que le corselet, bords latéraux arrondis non sinués, strie suturale entière, bifovéolée à la base, formant une ellipse avec celle du côté opposé, stries dorsales, obliques, convergentes, atteignant les deux tiers postérieurs. Parties latérales présentant une ligne de points plus ou moins nette et régulière.

Abdomen lisse, brillant, plus large que les élytres et s'élargissant progressivement en arrière jusqu'à l'extrémité du 3e segment.

Pattes grêles, tibias postérieurs sinués à leur extrémité.

Dessous.—Abdomen finement et peu densément ponctué, 5e segment court et coupé carrément à l'extrémité, dernier largement arrondi.

Mâle.—Plus robuste et plus large. Yeux plus volumineux, tempes plus courtes, corselet et élytres plus dilatés, plus transverses, Pattes plus robustes, 5e segment largement échancré, l'échancrure comprenant toute la largeur de la face ventrale.

Cette espèce n'ayant qu'une fossette latérale au prothorax ne peut être comparée qu'aux *F. pyrenaeus* Saulc. et *F. Guimjuni* Dod. Elle s'en distinguera à première vue par son corselet et ses élytres transverses et par la ponctuation remarquable de ces dernières.

Espagne.—Baléares, île d'Ibiza, 2 mâles et 1 femelle, capturés par Mr. Español (nov. 1935), à qui je suis heureux de dédier cette espèce.

Types in coll. Español et Normand.