

UNA VISITA A GREDOS

per

C. Pau

Sobre cuatrocientas formas diferentes recogí en seis días por los montes de Logroño, Burgos y Soria: este año pasado, en la provincia de Avila, no pude llegar á doscientas setenta.

Las plantas de Gredos hay que estudiarlas por comparación, porque hánse dado como idénticas á las de otras regiones, por ejemplo en las de Sierra Nevada, y á mí no me resulta esa conformidad.

La estructura de aquellas cumbres, vista con los gemelos desde los montes que separan Piedrahita de Navalperal de Tormes, me entristeció: rodé la cabeza y auguré poca recolección. Hay mucho pico, mucha inclinación en sus laderas: pocas llanuras. Lo verdaderamente rico en la Sierra de Gredos es la región montana: pero era tarde (23 de Julio).

El Pinar de Hoyoquesero es de lo más rico que conozco en España. Se puede comparar con el monte del castillo de Játiva; es muy parecido á ciertos rincones y valles del Pirineo Aragonés. Yo creo que en el centro de la Península no existe cosa que ni remotamente se le parezca. Aquello es un verdadero paraíso.

El día 24 de Julio salimos en compañía del Sr. Kheil, de Praga, de Navalperal de Tormes: nos refugiamos en un chozo de pastores que cerca de *las Pozas* existía. El día 25 subimos á la Laguna: el Sr. Kheil compara aquel anfiteatro rocoso con el *Circo de Gavarnie* y lo encuentra muy parecido. Aquella tarde herborizamos en las cercanías de la Laguna: fuera de nuestro alcance, pero no muy lejos de la orilla Norte, ví en abundancia un *Sparganium* que no pude recoger ni adivinar la especie. Leresche (*Deux exc. bot.* p. 148 in observatione) afirma que se trata del *Sparganium natans* L. Volvimos al chozo con las cajas bien repletas de hierbas raras, y al día siguiente (26) atravesando montes, ríos, barrancos y campos nos dirigimos á Navarredonda; pero como en el pueblo era feria,

temimos la aglomeración de gente en las posadas y dejamos el pueblo á la izquierda, yendo á dormir á la *Venta nueva* de San Martín.

El día 27 el Sr. Kheil marchó á Talavera y yo al Pinar de Hoquesero. Aquella misma tarde la diligencia me condujo á Avila.

Hé aquí una ligera noticia de las formas nuevas, críticas ó curiosas que traje, omitiendo las nuevas para la región (*Carex distaduja* Desf. por ejemplo) y las propias del país *Cirsium Bourgaeannum* Willk.! *Genista Carpetana* Lereschel!, etc.)

COTYLEDON GREDENSIS.—*Cotyledoni pendulina* per affinis, sed corollis magnis primo aspectu diversa.

Rocas de la región montana en compañía del *Sedum anglicum* Huds. var. *pyrenaicum* Lge.

CENTAUREA AVILÆ.—*C. Paui* Loscos valde proxima hoc non obstante, anthodii squamis in spínula molli producta apendice, ciliis longioribus disco nigro ovato ad basim membrana latissima, distincta.

En las rocas junto á la Laguna.—Dedicada á D. Pedro de Avila, por tener noticias de haberla recogido en el mismo sitio que nosotros, yendo en compañía de D. José Secall, há dos ó tres años.

FESTUCA PYRENAICA Reut. var. IBERICA (Hack.) Pau. *F. violacea* var. *iberica* Hack. monogr. 196 (1882).

Más arriba de los 2.000 m. en los montes vecinos á la Laguna.

Las gramíneas son abundantes; yo las descuidé bastante y hoy lo siento, porque han de existir novedades. ¿An *J. rubra* var. *pruinosa* Willk.?

GENISTA LANATA.—*Cytissi albi* facies sed foliis parvulis, petalis candidis, *Genista cineræ* leguminibus sed dense sericeis, lanatis, unde nomen. Eam nulla species mihi affinis dicere potest.

Laderas yesosas y calizas de la región montana.

ERODIUM ROMANUM (L.) W. var. CARVIFOLIUM (B. et R.) Pau.—*E. carvifolium* B. et R.

Praderas desecadas en los pinares de Navarredonda.

SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. var. GREDENSIS.

Caules simplices 15-40 cm. Folia eliptica cuneata apice lanceolata serrata serraturis mucronato-aristulatis. Anthodii squamæ externæ lanceolatis omnes plus minusve acutis. Ad varietatem *alpestrum* Willk. p. p. differt foliis brevioribus latioribusque dentibus maioribus. Eisdem caract. *alpestri* Boiss.—Variat foliorum margine integro! (Reyes Prosper, 25 Aug. 1904).

Más arriba de los 2.000m frecuente.

BRASSICA CHEIRANTHUS Vill. var. GREDENSIS.

Difiere de la var. *nevadensis* Boiss. por las hojas un poquito más pelosas, pedúnculos más largos, silicuas más anchas y doble mayores, pico más robusto y mayor.

Var ORTHOCARPA.—Subescaposa como la precedente y correspondiente como ella á la variedad *montana* Willkomm, pero las hojas son en mayor número é hirsutas, las silicuas erectas más cortamente pedunculadas. Difiere de la variedad *gredensis* por las hojas en mayor número, silicuas no adelgazadas en la base.

Cumbres de Gredos; pero la variedad *Gredense* sube á mayores alturas.

CENTAUREA CARPETANA B. et R. var. MAIORIFOLIA.

Folia ampliora et longiora capitulis robustioribus.—Pinar de Hoyoquesero.

ECHIUM GREDENSE.

Folia radicalia oblonga acuta, caulina linearia, caules simplices duplici indumento, primo vetifero, altero piloso; calyces laciniis linearibus obtrinculis; corola cornea tubulosa parce ampliata staminibus exertis; nucula parvula rugosa transverse, acuminata dorso carinata. A. *E. Pavoniano* Boiss., ex descriptione, differt foliis in petiolum longum attenuatis indumento simplici, panicula oblonga et habitu *E. vulgaris*.

Sitios pedregosos al rededor de la Laguna.

RUBUS HOYOQUESERANUS.

E sectione *Corylifolii* Jocke gr.? *Sub thyrsoides* Jocke.

Turiones angulato-sulcati glauci aculeis parvis rectiusculis; folia ternata longe petiolata petiolis villosulis; ramis fertilibus pubescentibus aculeis brevioribus, foliis longe pedunculatis quinatis petiolo canaliculato, foliolæ mediæ longe petiolulatae. Pomicula pauciflora floribus parvis, sepalis tomentosiss inæqualiter mucronatis petalis albis moris pubescentibus.

Pinar de Hoyoquesero ad vias.

RUBUS (*Koeleri* var.) GREDENSIS.

Turiones obtuse angulati faciebus canaliculatis. Rami fertiles aculeati, aculeis subulatis curvatis basi dilatatis, et dente glanduloso setosi. Folia quinata sat petiolata, foliolis discoloribus serratis, serraturis brevibus, medio longe petiolulato. Pomicula pauciflora, sépalis tomentosiss villosis et glandulosis mucronatis mucrone elon-

gato, petalis ovatis unguiculatis staminibus stylis longioribus

Navarredonda junto á los caminos y en compañía del *R. thyrsoides* Wimm., sin producir híbridos! rarísimo.

BUTINIA BUNIOIDES B. et R. var. GREDENSIS.

Estilos abiertos en ángulo obtuso, á lo sumo, horizontales.—Región alpina.

HIERACIUM CINERASCENS Jord. var. CARPETANUM (Uk.) Pau.—*H. carpetanum* Willk.! e loco.

Apenas constituye variedad esta compuesta que no es rara á 2.000m.

SILENE CILIATA POURR. var. ARVATICA (Lag.) Pau.—*S. Arvatica* *S. ciliata* var. *geniculata* Willk. (non Pourr.)

Varios autores (Leresche, Levier, Avila, Secall) indicaron aquí esta forma que se encuentra á unos 2.200m de altura en sitios pedregosos.

BISCUTELLA LÆVIGATA L. var. GREDENSIS.

B. variæ Dum. affinis. Humilis 20 cm. caulibus simplicibus rosularum foliis 30-40mm. oblogo-spathulatis margine 2-4 dentatis parce villosis, caulinis 2-3 parvulis bracteifumis, floribus parvis, siliculis corymboso-racemosis, lævibus latitudine 6mm.

Sierra de Gredos.

Var.) STRICTIFOLIA.

B. Limæ Rehb. habitu. Robusta 30-40 cm. foliis radicalibus hirtis linearibus plurimis erectis densis, margine integris, subdentatis vel profunde 2-6 dentatis, caulinis minoribus ciliatis integris seu dentatis floribus mediocribus, siliculis ad basim et ad summum truncatis dense granulatis.

Avila (Barras, Gutierrez) en las rendijas de las rocas (Pau), Mayo y Junio.

OENANTHE GALLOECICA P. et M. var. HERCULEA.

Robusta maior valde pruinosa umbellis fructiferis magnis petiolis longioribus robustioribusque ut fructu.

Pinar de Hoyoquesero en los riachuelos.