

Hab.: Según Colm. (1) «España en Andalucía, (Barr., Née, »Clem.);..... Fr. Abr., Nov. (V. v.)».

La tenemos recogida en la acequia del molino del Real de Gandia, y en los manantiales de su vecino pueblo de Xeresa; donde la encontramos de nuevo por Enero del corriente, á vuelta de diez años de haber herborizado por aquellos parajes. Sub espontánea se la ve crecer en las paredes exteriores de las estufas del Jardín Botánico de Valencia.

Nomb. vulg.: «Cast.: *Polipodio* ó *Filipodio cordobés*, (F. Nav.) (2).

Orihuela, Mayo 1911.



APLECH DE NOTICIAS SOBRE'LS MOLUSCHS DE CATALUNYA y catálech provisional dels mateixos

per Manel de Chia

(CONTINUACIÓ)

NASSA

Monterosatoi, Loc.=*Amycla corniculum*, Olivi, var.
mutabilis, L.

» » var. *inflata*, Lamk.
» » » *junior*, B. D. D.
» » *Petit.*=*N. mutabilis*, L.

nana. Yam.=*Neritula*, *neritea*, L.

nitiola. Jeff.=*N. reliculata*, L. var.

pellucida, Risso.=*Neritula Donovani*, Risso, var.

pygmaea, Lamk.

reticulata, L.

» » var. *curta*, B. D. D.
» » » *nitida*, Jeffr.
» » » *nitido-depicta*, B. D. D.
» » » *Poisieri*, Loc.

(1) L. cit.—Omitim noms de pobles; mes vègeu les localitats que hi afeigim.

(2) Colm., l. cita.

unifasciata Kiener.=*N. costulata*, Ren. var.

valliculata, Loc.=*N. incrassata*, Müll. var.

NATICA.

Alderi, Forbes.

catenata, Da Costa.=*N. catena*, Da Costa.

complanata, Loc.? = *N. Guillemini*, Payr. var.

crassatella, Loc.=*N. intricata*, Don. var.

Dillwyni, Payr.

fusca, Blain.

glancuia, L.=*N. Alderi*, Jorbes.

Guillemini, Payr.

hebraea, Martyn.

» Montg. } = *N. hebraea*, Martyn.

» Reclus. }

imbricata, Don.

josephinia, Risso.

macilenta, Phil.

millepunctata, Lamk.

monilifera, Lamk.=*N. catena*, Da Costa.

neustriaca, Loc.=*N. Alderi*, Jorbes, var.

olla, M. de Serres.=*N. josephinia*, Risso.

poliana, Delle Chiaje.=*N. Alderi*, Jorbes.

pulchella, Risso.=*N. Alderi*, Jorbes, var.

punctata, Karsten.=*N. millepunctata*, Lamk.

sagraiana, Orb.

valenciennèsii, Payr.=*N. intricata*, Don.

NEPTUNEA.

contraria, L.

NERITINA.

viridis, Lamk. } = *Smeragdia viridis*, L.

» L. }

NERITULA.

Donavani, Risso.

neritea, L.

» » var. *minor*, Monterosato.

NUCULA.

decussata, Sow.=*N. sulcata*, Brom.

nitida, Sow.

nucleus, L.

nucleata, L. = *N. nucleus*, L.

radiata, Hanley. = *N. nucleus*, L. var.

sulcata, Brönn.

» Born. = *N. sulcata*, Brönn.

tenius, Montg.

OCINEBRA. = Murex.

aciculata, Rob.

Edwardsi, Monts. *M. Edwardsii*, Payr.

erinacea, Fischer. = *M. erinaceus*, L.

Mayendorffi, Calc.

nucalis, Reeve. = *Edwardsii*, Payr. var.

tarentina, Lamk. = *M. erinaceus*, L. var.

OCTOPUS.

granulatus, var. *vulgaris*, Lamk.

macropus, Fisch.

vulgaris, L.

ODOSTOMIA.

conoidea, Brocchi.

decussata, Phil.

doliolum, Phil.

excavata, Phil.

Hortensiae, Nausonty.

OMMASTREPES.

sagittatus, Lamk.

OSTREA.

cochlearis, Poli. = *O. cochlear*, Poli.

cristata, Born. = *O. edulis*, L. var.

depressa, Lamk. = *O. eaulis*, L. var.

edulis, L.

hippopus, L.

lamellosa, Brocchi. = *O. edulis*, L. var.

stentina, Payr.

» » var. *Pepratxi*, B. D. D.

(Continuará)

Fauna ictiològica de Catalunya

Catálech rasonat dels peixos
observats en el litoral y en les aigües dolces catalanes

PER

AGUSTÍ M.^a GIBERT

(Continuació)

Família dels CALLIONYMIDÆ, Bp.

Género, CALLIONYmus, Linn.

Callionymus lyra, Linn.

(Mascle gran.)

Syn: *Callionymus lyra*, Lacep., Cuv. et Valenc., Guichen, CBp., Günth., Canestr.

(Femella.)

Syn.: *Callionymus dracunculus*, Lacep., Bloch, Cuv. et Valenc., Guichen.

Nom vulgar: Guineu vermella, Tarragona; Dragó, Menorca. Especie rara.

La *Callionymus elegans*, Lesueur; es la petita ó de cria (*Callionymus Sueurii*, Cuv. et Valenc.)

Callionymus maculatus, Rafin.

Syn.: *Callionymus cithara*, Cuv. et Valenc.; *Callionymus lyra*, Riss.; *Callionymus maculatus*, CBp., Günth., Canestr.; *Callionymus Dracunculus*, Brunn.

Nom vulgar: Guineu, Tarragona; Pau, Barcelona; Ferrepedres, Menorca.

Callionymus Dracunculus, CBp.

Syn.: *Callionymus lacerta*, Cuv. et Valenc., Guichen.; *Callionymus Dracunculus*, Canestr.; *Callionymus admirabilis*, Riss.;

Callionymus pusillus, Del., Riss.; *Callionymus festivus*, Pallas, Nordmann; *Dracunculus*, Gesner, Willugh., Rond.

Nom vulgar: Guineu, Tarragona. Especie nova per Catalunya.

Callionymus Belenus, CBp.

Syn.: *Callionymus Morissonii*, Riss., Canestr.; *Callionymus Risso*, Lesueur, Cuv. et Valenc.; *Callionymus Belenus*, Günth. Canestr., Cuv. et Valenc., Riss.; *Callionymus sagitta*, Riss.; *Belenus*, Rond.; *Blennus vel Belenus*, Gesner.

Nom vulgar: Guineu, Tarragona; Pau, Barcelona; Cabot en banyes, Menorca.

Se'n troben bastantes entre 'l Xanguet o Carmelo ros (*Aphia pellucida*, Moreau.)

Família dels LOPHIIDÆ.

Género LOPHIUS, Arted.

Lophius piscatorius, Linn.

Syn.: *Batrachus piscatorius*, Riss.; *Rana marina*, Bell.; Galanga, Rond.; *Rana piscatrix*, Willugh.; *Lophius piscatorius*, Riss., Cuv. et Valenc., Lacep., Bloch, CBp., Canestr., Günth.

Nom vulgar: Rap, Barcelona, Tarragona; Rap, Buldroi, Menorca.

Lophius Budegassa, Spinola.

Syn.: *Lophius parvipinnis*, Cuv.; *Lophius Budegassa*, Riss, CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Rap fataire, Tarragona; Rap, Barcelona.

En el pahidor d'alguns raps els hi havem trobat sencer el molusch, *Scaphander lignarius*, Linn.

Tribu dels ACANTHOPTERYGIS
thoracichs.

Família dels GOBIIDÆ.

Género, GOBIUS, Arted.

Gobius Jozo, Linn.

Syn.: *Gobius nebulosus*, Riss.; *Gobius tertius*, Willugh.; *Gobius Jozo*, Cuv. et Valenc., Lacep., Riss., CBp., Canestr., Günth.

Nom vulgar: Ruch d'alga, Tarragona; Burru, Barcelona; Gobit d'alga, Costa de Llevant; Cabot d'alga, Menorca.

Var. Gobius longiradiatus, CBp.

Syn.: *Gobius longiradiatus*, Riss., Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Ruch, Tarragona; Burru, Barcelona; Gobit, Costa de Llevant; Cabot mucós, Menorca.

Gobius lota, Valenc.

Syn.: *Gobius ophiocephalus*, Pallas, Günth.; *Gobius lota*, CBp., Canestr., Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Ruch, Tarragona. Especie nova per Catalunya.

Gobius Guttatus, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Gobius guttatus*, CBp., Canestr.

Nom vulgar: Ruch de roca, Tarragona; Gobit de roca, Costa de Llevant; Cabot de roca, Menorca.

Gobius cruentatus, Gml.

Syn.: *Gobius cruentatus*, Lacep., Riss., Cuv. et valenc., Guichen., Linn., CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Ruch, Tarragona; Burru, Barcelona; Gobit, Costa de Llevant; Cabot anglés, Menorca.

Gobius quadrímaculatus, Valenc.

Syn.: *Gobius aphia*, Riss.; *Gobius quadrimaculatus*, Cuv. et Valenc., Guichen., CBp., Canestr.

Nom vulgar: Ruch, Tarragona. Especie nova per Catalunya.

Gobius minutus, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Gobius elongatus*, Canestr.; *Gobius minutus*, CBp., Günth., Guichen.

Nom vulgar: Ruch, Tarragona; Gobit, Costa de Llevant; Cabot, Menorca.

Gobius auratus, Riss.

Syn.: *Gobius auratus*, Cuv. et Valenc., CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Ruch, Tarragona. Especie nova per Catalunya.

Se'n troben molts entre'l carmelo (*Meletta Phalerica*, M.; *Alau-sa Pilchardus*, Cuv. et Valenc.)