

per axó es fàcil explicar-se el que's presentin junts formant transit de l'un a l'altre, essent abdos silicats hidratats de ferro y alumina ab més o menys predomini d'un de aquets dos darrers, formant espècies diferentes ab els caracters propis de quiscuna d'elles.

Aquestes noves proben evidentment lo que digué en el meu petit treball «Els Minerals de Catalunya», que hi ha molt que estudiar sobre mineralogia en nostre terra, y que no hi ha cap dubte qu'el treball qu'es fassi se veurá recompensat ab lo troballa d'una munió d'espècies que han passat desapercebudes fin are.

L. TOMÀS.

Octubre de 1912

## NOTES CECIDIOLOGIQUES

PER

DOMINGO VENTALLÓ

Com a continuació de la primera nota sobre Zoocecidiás de Catalunya, publicada en el Bulletí n.º 5 de 1905 de l'Institució, crech interessant encare que siguin poques, citar les espècies següents trovades durant l'any passat pels voltants de Barcelona:

*Tetraneura cornicularia*, Pass. (Aphidit) sobre la mata (*Pistacia lentiscus* L.) a Vallvidrera.

*Pemphigus bursarius* (Aphidit). En els troncs del pollanç (Populus nigra). Prat de Llobregat: es forma tal volta nova que sols recullint-ne en cantitat per poguer determinar l'insecte ab molts exemplars á la vista podrà precisarse.

*Eriophyies tiliae* Nat. (Aracnit) sobre el Tell (*Tilia plahyphylla* Scop).

*Andricus trilineatus*, Hart (Himenopter) en les fulles de la alsina (Querens ilex, L.). Vallvidrera.

*Andricus pseudo inflator* a les fulles del Quercus ilex y del Q. lusitanica a la mateixa localitat del anterior.

*Plagiotrochus ilicis* (Himenopter) sobre les fulles del Q. ilex, L. Vallvidrera.

*Plagiotrochus fusifex*, Mayr (Cinipit) sobre el Q. ilex, a Vallvidrera y observada també a Terrassa.

*Contarinia ilicis*, Kieff. (Dipter), fulles del Q. ilex, a Sarriá y Vallvidrera.

*Neuroterus baccarum*, L. (Cinipit), sobre les fulles del Q. lusitanica, en les mateixes localitats.

Barcelona, Septembre 1912.

## Dípteros de Cataluña

---



---

### 1.<sup>a</sup> SERIE

---

(Continuación) <sup>(1)</sup>

134. *Tephrhitis arnicae*, L.

Monte Farell, 1-VI-09.

Mongat, 20-XII-09.

íd. 28-I-10.

íd. 17-III-10.

íd. 2-IV-10.

íd. 12-V-10.

Común; todo el año; basta pasar la manga por encima las plantas bajas, en los torrentes, en lugares donde dé el sol. La larva en las cápsulas de Carduus.

(1) Véase BUTLLETÍ DE LA I. C. D'H. N., n.<sup>os</sup> 6, 7 y 8, any 1912.