

## Description d'un nouvel "Oxypoda"

[COL. Staphylinidae] de Catalogne

par

P. DE PEYERIMHOFF

**Oxypoda** (*Baptopoda*) **Zariquieyi**, n. sp.—Long. 2,30 mm.—Elongata, gracilis, opacula, rufa, capite abdominisque segmentis 4-5 exceptis infuscatis. Caput longius quam latius, oculis minutis, vix prominulis. Antennae versus apicem spissatae, art.<sup>o</sup> 3.<sup>o</sup> quam 2.<sup>o</sup> vix brevior, penultimis latioribus quam longioribus duplo, ultimo praecedentibus binis sumptis aequale. Pronotum vix latius quam longius, convexum, apice attenuatum, basisinuatam, angulis posticis subflectis, perdense granulosum. Coleoptera pronoto longiora et angustiora, deplanata, sutura elevata, lateribus acute carinatis, apice leviter sinuata ad angulos posticos emarginata, perdense ut pronotum sculpta. Abdomen ad basim dense granulosum, versus apicem sensim levigatum et sericatum.

Variat capite rufulo (abdomine autem nigro annulato).

Catalogne: Barcelone: Rabasada. Tarragone: Valls, Puertos de Beceite.—Découvert par M. le Dr. R. Zariquiey, à qui j'ai le plaisir de dédier cet insecte, et qui a bien voulu me faire don de l'un des trois spécimens qu'il avait recueillis.

Sous le nom de *Baptopoda*, Bernhauer (*Verhandl. der k.-k. zool.-bot. Gesellsch. Wien*, LII, 1902, p. 133 et 176) a réuni les *Oxypoda* présentant une sculpture rude et dense et des élytres déprimés, carénés sur les côtés. Ces insectes se relient manifestement aux *Deropoda* Bernh. (*loc. cit.*, p. 134 et 173) par l'*Oxypoda transgressa* Peyrh., où cette carène latérale est presque effacée, bien

que la dépression des élytres soit encore très apparente.—Au reste, leurs caractères spécifiques, résumés dans le tableau qui suit, sont des plus nets:

1. Yeux près de trois fois plus longs que les tempes. Tête aussi large que longue. Elytres beaucoup plus courts et plus étroits que le pronotum . . . . . *magnicollis* Fauv.  
— Yeux plus courts que les tempes . . . . . 2
  2. Tête transversale. Pronotum à peine plus rétréci en avant qu'en arrière . . . . . *graeca* Kr.  
— Tête plus longue que large. Pronotum nettement plus rétréci en avant qu'en arrière. . . . . 3
  3. Carène latérale des élytres presque effacée, leur bord apical très fortement incisé à l'angle externe . . . *transgressa* Peyrh.  
— Carène latérale des élytres très prononcée, leur bord apical bien moins fortement incisé à l'angle externe . . . . . 4
  4. Antennes grêles et relativement courtes, leurs pénultièmes articles deux fois plus larges que longs. Elytres un peu plus longs que le pronotum. Tête noire ou rousse. . . *Zariquieyi* Peyrh.  
— Antennes allongées, leurs pénultièmes articles de moitié seulement plus larges que longs. Elytres à peine de la longueur du pronotum. Tête rousse. . . . . *depressipennis* Aubé.
-