

Sobre Dípteros catalanes

Nota 3

El Dr. Villeneuve de Rambouillet, con su competencia y amabilidad característica, ha querido estudiar y rotular algunos Dípteros de las Familias *Leptididae*, *Therevidae* y *Tachinidae* que al objeto de aportar algún dato más y de dar a conocer mejor nuestra fauna dipterológica le había yo enviado al efecto, de entre los apresados por mí mismo en mis excursiones por el Principado. El resultado de su examen es interesante, pues de las quince especies determinadas, cinco son nuevas para España, cuatro para Cataluña y las demás, excepto *Sarcoph. carnaria* L., no muy sobradas de localidades conocidas.

Después de dar las gracias al sabio Dr. Villeneuve paso a dar cuenta del resultado.

FAM. LEPTIDIDAE

177. *Leptis conspicua* var. *striola* Meig.
Teyá (B.), 21, V. 11.
Nueva para España.

FAM. THEREVIDAE

178. *Thereva arcuata* Lw.
Barcelona-Gracia, mi jardín, 17. V. 14.
Citada de Mallorca (Moragues); Bilbao (Seebold);
Játiva (Czerny). Por consiguiente nueva para Cataluña.

FAM. TACHINIDAE

179. *Peletieria ruficeps* Macq.
Moncada (B.), 8. IV. 14.
Conocida de Madrid (Lauffer y Dusmet), El Pardo (Lauffer); Cintra, Portugal (Yezbury).
Por lo tanto nueva también para Cataluña. Conocida del Sud de Francia.

180. *Nemoraea vicina* Macq. hembra.
Moncada, 8. V. 14.
El Dr. Villeneuve dice que no puede todavía distinguirla de la hembra de *N. pellucida* Meig. de otro modo que por la talla menor. Un macho que él posee tiene la misma talla que mi hembra, el abdomen de un amarillo rojizo cortado por una banda negra medio-dorsal primero ancha sobre el 1.^{er} segmento, luego estrecha sobre el 2.^o y el 3.^{er} segmentos, ausente sobre el segmento 4.^o—*N. pellucida* Meig. es ya conocida de Cataluña. Cornet (Antiga).
181. *Phasia crassipennis* Fabr.
Valle de Aran, Lés, 18. IX. 13 (Léon Hilaire!); Set-casas (G), 1-15. VIII. 11.
Conocida de Bilbao (Seebold).
Nueva para Cataluña.
182. *Sarcophaga hæmorrhœa* Meig.
Desembocadura del río Besós (B.), 19. IV. 12, Mongat (B.), 12. V. 09, Moncada, 8. IV. 14.
Conocida de Algeciras, Tarifa, San Fernando, Elche (Czerny y Strobl).
Nueva para Cataluña.
183. *Sarcoph. setipennis* Rond.
Mongat. 21. IV. 09.
Citada de otras localidades españolas y de Cataluña Monistrol (Strobl y Czerny); también de Mallorca (Moragues)
184. *Sarcoph. Fertoni* Villen.
Alrededores de Barcelona (Carmelo), 12. III. 13.
Nueva para la península.
185. *Sarcoph. melanura* Meig.
Masnou (B.), 17. III. 12 + 5. IV. 12.
Conocida de distintas localidades españolas y respecto de Cataluña únicamente de Malgrat (Czerny y Strobl).
186. *Sarcoph. tuberosa* var. *exuberans* Villen.
Mongat, 10. V. 09.
Nueva para España.
187. *Sarcoph. hæmorrhoidalis* Fall.
Mongat, 10. V. 09, Masnou, 11. IV. 12 + 26. IV. 12. + 17. III. 12, alrededores de Barcelona (Carmelo) 12. III. 13.

Conocida de Rosas (Cuní); Mallorca (Moragues); Bilbao (Seebold); Portugal (Welwitsch); Gibraltar (Fowler).

188. *Sarcoph. uncurva* var. *penicillata* Villen.
Mongat, 23. IV. 09. + 25. V. 09, Moncada, 8 IV. 14.
Nueva para la península.
189. *Sarcoph. carnaria* L.
Moncada, 8. IV. 14.
Conocida.
190. *Sarcoph. Beckeri* Villen.
Mongat, 23. IV. 09, Masnou, 5. VI. 11 + 5. IV. 12.
Nueva para España.
191. *Sarcoph. filia* Rond.
Mongat, 10. V. 09, Moncada, 8. IV. 14.
Conocida sólo de Monistrol (Strobl).

ASCENSIO CODINA

Barcelona-Gracia, 29-IX-14.

BIBLIOGRAFÍA

Fauna Ibérica. - Mamíferos

por ANGEL CABRERA, Madrid, 1914

Baix els auspicis de la Junta d'Ampliació d'estudis e investigacions científiques, s'ha publicat la obra més complerta, que sobre qualsevol part de la Historia Natural espanyola haigi vist la llum pública; la fauna mammalògica d'Espanya, fruit dels estudis i correríes del distingit naturalista D. Angel Cabrera. Aqueix nom, diu per si sol lo qu'es