

es *atenuado*, y esta tiene el peristoma *subcontinuo* y la otra *no*. Añadamos para terminar los caracteres de tamaño que distinguen unas y otras estas especies que hemos señalado.

La *Testacella haliotidea* (entiéndase todas en completo desarrollo y extensión) el animal tiene unos 8 centímetros de longitud y la concha de 6 a 8'5 milímetros.— La *dubia* al animal de 8 a 10 centímetros y su concha 9 a 9'5 milímetros. La *Barcinonensis*, animal de 4 centr. y concha 5'5 milimetr. y la *Catalonica*, animal de 3'5 centímetros con la concha de 4'5 a 5 milímetros.

Barcelona, 10 Mayo 1924.

---



---

### Nota Bibliogràfica

**Formiche di Spagna raccolte dal Prof. FILIPPO SILVESTRI.** Prof. C. EMERI. Bolletino del Laboratorio di Zoologia generale e agraria della R. Scuola superiore d'Agricoltura in Portici. Vol. XVII, p. 165-171 (Publicato il 29 marzo 1924).— Aquests insectes és recol·lectaren en les localitats següents: Barcelona: Manresa; Montjuich, Tibidabo (entorns de les Urbs). Girona: Lloret de Mar, Santa Coloma de Farnés, Gualba. Tarragona: Reus, Arnes, Montsià, Uldecona. Valencia: Puig, Murcia. Andalusia: Córdoba, Sevilla, Málaga, Algeciras, Benajoan. El sojorn de referència del Prof. Silvestri a Espanya fou els últims mesos de l'any 1922, i principis del 1923. Com a contribució al inventari de les formes Catalanes no esmentaré sinó les d'aquestes localitats. 3 d'aquestes 14 formes son noves per a la Ciència.

*Aphaenogaster (Aph.) testaceopilosa* v. *senilis*, Mayr. Montjuich.

" " *gibbosa* v. *levior*, Forel. Lloret, Gualba.

*Messor barbarus*, L. Manresa, Montjuich, Uldecona.

*Pheidole pallidula*, Nyl. Manresa, Tibidabo, Arnes, Uldecona.

*Crematogaster (Orthocrema) sordidula* Nyl. var.? Montsià.

" (*Acrocoelia*) *scutellaris*, Ol. Montjuich, 12.XII-22.

*Solenopsis fugax*, Latr. Gualba.

*Leptothorax luteus*, Forel v. *subcingulata* n. var. Tibidabo.

*Tetramorium caespitum ruginode*, Stütz. Montsià.

" *silvestrianum* n. sp. 2 exemplars, Manresa.

*Camponotus (Myrmoturba) sylvaticus* v. *catalana* n. var. Tibidabo, Manresa.

*Camponotus (Myrmoturba) lateralis piceus*, Leach. Montsià.

*Lasius (Lasius) niger*, L. Diverses localitats de la província de Barcelona,

*Lasius (Chthonolasius) umbratus rabaudi?* Bondroit. Gualba, Arnes.—A. CODINA.