

als *Speophilus*, afeigint la descripció de noves formes del mateix grup cassades per l'autor i localitats noves de formes ja conegudes en part publicades ja en el BUTLLETÍ però anticipant-ne solament els noms d'aquelles (v. BUTLLETÍ, Febrer-Març, 1924, p. 40-41).

De la zoogeografia de *Speophilus Kiesenwetteri* Dieck l'autor innova:

a) sbsp. *Sant-Llorensi* nov. Tipus: Cova de Santa Agnès, Sant Llorens del Munt. Altres localitats: Cova de les Animes, del Frare, Nova, del Manel, dels Obits, Simanya, Avenc del Club i de can Pobla, del Davi.

b) subraça *Castellsaperaí* nov. Tipus: 3 Avenc de Castellsapera, San Llorens del Munt. Altres localitats: Avenc de les Pinasses, Cova fosca de Matarrodona, Avenc de Sant Jaume, Balmes de Mural. Ultra dels 4 exemplars que cita l'autor n'hi ha 9 més en la meva col·lecció (Codina) procedents del Avenc de Castellsapera, 12-X-13.

c) sbsp. *Kiesenwetteri* Dieck. Tipus: Coves del Salitre, Montserrat. Altres localitats: Cova Freda, un Avenc sens nom del camí de Collbató al Monestir, Avenc de Costa-dreta, Cova del Pas en Castellolí. L'abundància d'aquest insecte en les Coves del Salitre és tal que conservo en la meva col·lecció (Codina) 280 exemplars aplegats allí el 23. VII. 10, de entre els molts que no s'aprofitaren. Recordo que el guia va contar-me, respecte aquest particular, que una vegada un anglès que àdhuc vingué a les coves a la recerca de l'insecte, pensant sens dubte que serien grans les dificultats per a trobar-ne uns quants, li va prometre una peseta per cada exemplar que atrapessin i amb aquestes promeses anaven pausadament endinsant-se en les coves, però en arribar al primer àpat era tal el bellugeig que al anar contant els que anaven a parar al pot, aviat cridà l'inglés, prou, prou!

d) sbsp. *Patracoi* Zar. Tipus: Cova del Patracó, Collbató.

Troglocharinus Ferreri sbsp. *Fonti* nov. Tipus: Avenc del Vermell, entorns de Begues.

S'intercalen algunes bones il·lustracions de l'autor i del Dr. Jeannel que àdhuc ha examinat els insectes i ha donat un cop de mà al treball.—A. CODINA.

Descrizione del maschio del *Belisarius Xambeui* E. Sim. (ARACHNIDA SCORPIONES). Dr. ALFREDO BORELLI. Publicaciones de la Junta de Ciencias Naturales de Barcelona—1924. Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Vol. IV, n.º, 9, Julio de 1924.—4 exemplars 1 ♂ 1 ♀ 2 joves d'aquest escorpi cec recollits pel Prof. F. Silvestri endinsats prop de cinquanta centímetres al peu d'un marge boscos a Hostaléts de Bas (Província de Girona.) 26. 1. 23 comunicats al especialista de Torino Dr. Borelli han motivat aquesta nota en quina l'autor descriu el ♂ que era encara inèdit i que's diferencia per alguns caràcters de la descripció original de Simon que correspon exactament a la ♀ segons l'autor.

L'escorpi era conegut dels Pireus Orientals francesos. El P. Navàs, S. J., fou el primer en trobar-lo a Catalunya a Ribas del Freser dessota d'una pedra al boc a l'estiu de 1919. Posteriorment, en juliol de 1923, l'he trobat en la Font de Rajols entre la fusta consumida d'un faig aterrat i àdhuc en l'humus de dessota la fullaca; la font es trova anant de Cantonigrós a Tavertet (Cabrerès—Barcelona). Em sembla, per algunes observacions *in situ*, que aquest animal, s'alimenta quasi exclusivament de *Iulus* (Miriopoda), pels restes d'aquests que juntament he trobat amb ell. —A. CODINA.

Tenebrioniden (INS., COL.) aus dem nördlichen und östlichen Spanien gesammelt von Dr. F. HAAS in den Jahren 1914-1819. A. ANDRES. Sonderabdruck aus "Senckenbergiana", Bd. VI. Heft 3/4. Frankfurt a. M., den 1 April 1924.—20 són les espècies determinades per l'autor de Tenebrionids aplegats pel Dr. HAAS, membre corresponent, durant la seva permanència a Catalunya, especialment a Flix (rov. de Tarragona), que actualment comanen al Museu de Senckenberg. Aqueixes són:

Asida (Glabrasida) goudoti Sol. var. *costulata* Sol.

(=*ventricosa* Sol.) Pobla de Segur (Prov. de Lleida).

Asida (Glabrasida) gracilis Alld. Flix.

Asida (Glabrasida) annina Reitt. Flix

Asida (Polasida) sericea Oliv. Flix.

Akis sansi Sol. Pobla de Segur.

Akis accuminata Sol. Flix.

Scaurus varvasi Sol. Flix.

Scaurus sticticus Gemm. Flix.

Pimelia sulcata Fouch. (= *bipunctata* F.) Vall del riu Mataranya prop Fayón (Prov. Zaragoza).

Pimelia baetica Sol. Silla (Prov. Valencia).

Pimelia modesta Herbst (= *distincta* Kraatz). Flix.

Blaps lusitanica Herbst. Flix.

Blaps gigas L. Flix.

Blaps sp.? Flix. Li sembla un exemplar molt «aberrantes» de *lusitanica*.

Blaps lethifera L. Flix.

Heliophilus ibericus Muls. Flix.

Heliophilus rotundicollis Luc. Flix.

Heliophilus agrestis Muls. Flix.

Gonocephalum pusillum F. Flix.

Opatrum perlatum Germ. var.! Flix. Una varietat caracteritzada per grosses fossetes irregulars.

De cada espècie dona àdhuc la distribució geogràfica. — A. CODINA.