

Carabids de la comarca de Vich i Montseny capturats  
en Març i Abril de 1929.

per

A. VILARRUBIA

<i>Carabus (Megodontus) violaceus</i> v. <i>Mülleri</i> , Haury . . . . .	1
( <i>Mesocarabus</i> ) <i>problematicus</i> v. <i>Xoxarsi</i> , Born . . . . .	1
( <i>Chrysotribax</i> ) <i>rutilans</i> , Dej. v. <i>aragonensis</i> (Latr. i litt.) Lap. ♂	1
<i>Nebria picicornis</i> , F . . . . .	1
( <i>Oreonebria</i> ) <i>brevicollis</i> , F. . . . .	4
<i>Bembidion (Lopha)</i> 4-guttatum, F. . . . .	1
<i>Tachys bistriatus</i> . v. <i>testaceus</i> , Motsch. . . . .	2
<i>Trechus 4-striatus</i> , Schrank . . . . .	2
<i>Clivina collaris</i> , Herbst . . . . .	3
<i>Callistus lunatus</i> , F. . . . .	1
<i>Chlaenius (Epomis) circumscriptus</i> , Duft . . . . .	10
( <i>Chlaenius</i> ) <i>vestitus</i> , Payk. . . . .	7
<i>nitidulus</i> v. <i>tibialis</i> , Dej. . . . .	2
<i>fulgidicollis</i> , Duf. . . . .	4
( <i>Trichochlaenius</i> ) <i>chrysocephalus</i> , Rossi . . . . .	8
<i>Licinus aequatus</i> , Serv. . . . .	1
<i>Diachromus germanus</i> L. . . . .	6
<i>Gynandromorphus etruscus</i> , Quensel . . . . .	1
<i>Ophonus (Pseudophonus) pubescens</i> , Müll. . . . .	2
<i>azureus</i> , F. . . . .	3
<i>puncticollis</i> , Payk. . . . .	Abundant.
<i>Harpalus aeneus</i> , F. . . . .	2
( <i>Lasioharpalus</i> ) <i>distinguendus</i> , Duft. . . . .	3
( <i>Pheuginus</i> ) <i>tardus</i> , Panz. . . . .	1
<i>Acinopus megacephalus</i> , Rossi . . . . .	2
<i>Stenolophus Skrimshiranus</i> , Stph. . . . .	1
<i>Amara aenea</i> , Gér. . . . .	2
<i>familiaris</i> , Duft. . . . .	2
<i>Sogines punctulatus</i> , Schall . . . . .	2
<i>Poecilus cupreus</i> , L. . . . .	6
<i>Koyi</i> , Germ. . . . .	1
<i>Lagarus vernalis</i> , Panz . . . . .	3

<i>Abacetus Salzmanni</i> , Germ.	3
<i>Laemostenus terricola</i> , Hebst.	1
<i>Calathus fuscipes</i> , Goeze	12
<i>melanocephalus</i> , L.	9
<i>Agonum ruficorne</i> , Goeze	1
<i>Deltomerus rufipennis</i> , Dej.	1
<i>Idiochroma dorsale</i> , Pont..	Freqüent.
<i>Microlestes Abeillei</i> , Bris.	10
<i>Demetrias atricapillus</i> , L.	0
<i>Dromius 4-maculatus</i> , L.	2
<i>Cymindis melanocephala</i> , Dej..	2
<i>Trymosternus onychinus</i> , v. <i>plicipennis</i> , Chaud.	1
<i>Drypta dentata</i> , Rossi	52
<i>Brachinus crepitans</i> , L.	3
<i>explodeus</i> , Duft.	Freqüent.
<i>esclopeta</i> , F.	15
<i>Aptinus pyrenaeus</i> , Dej.	3

### Notes Bibliogràfiques

**Contribución al conocimiento de los Japygidae (THYSAN) de España.** F. SILVESTRÍ, «Eos», Revista Española de Entomología, T. V. cuaderno 1º, pág. 81 (fig. I-XII), 20 mayo, 1929. Junta para Ampliación de Estudios. Madrid.—Res era coneugut fins ara dels *Japygidae* d'Espanya segons l'autor d'aquest article tant ben documentat en text i figures, estudi d'una petita col·lecció tramesa pel Museu de Madrid i d'un altre *Japyx* nou recollit pel autor mateix en diferents llocs de la costa mediterrànea d'Espanya. Anota sis espècies de *Japyx* i dugues varietats d'una d'aquestes que són: *Japyx solifugus* Hal., *J. bolivari* sp. n., *J. major* v. *hispanica* nov., *J. major* v. *andalusiaca* nov., *J. codinai* sp. n., *J. morodri* sp. n., *J. pieltaini* sp. n. En comparació amb els d'Italia i França aquest nombre de *Japigidae* es crescut i creu que poc podrà augmentar-se i es interessant per la diversitat de espècies, que fins prova en contra, poden considerar-se peculiars a la fauna ibérica.—A. CODINA.

**El *Cryptolæmus Montrouzieri* Muls. parásito del *Pseudococcus Citri* Risso.** Estación Regional de Patología Vegetal, 1929. Valencia.—Es un dels treballs d'aquest centre anexe a la Granja de Burgasot (Valencia) per tal de introduir i de aclimatar en Espanya els paràsits naturals dels inse-