

Alguns Hemípters (Heteròpters i Homòpters) de Catalunya i del Maròc espanyol

per

A. CODINA.

Els exemplars de la següent llista de Hemípters han sigut capturats per altres companys i per l'autor d'aquesta nota en les excursions llurs per Catalunya i Maròc espanyol. Quan es fan referències zoogeogràfiques si hi ha alguna observació a fer entenguís que són les del Catàleg de OS-HANIN (1912) (1). El Dr. LALLEMAND de Uecla (Bruxelles, Belgique) i senyor DE LA TORRE-BUENO de White Plains (New-York, U. S. A.) amb una complacència digna de elogi han revisat aquests Homòpters i Heteròpters que són les seves especialitats respectivament. Els Hemípters en general són aquí poc coneguts, les dades llurs, anque les més banals, son útils de consignar-se.

Homoptera

Aprofito aquesta oportunitat per a citar la *Melampsalta flaveola* Br. molt comú a Fuentálamo prop de Baeza en la província de Jaén, 16-VI. 23.

Philaenus leucophthalmus (L.) Maròc: Cabo Espartel, 29. IV. 21.

Philaenus leucophthalmus v. *populi* (F.) Maròc: Beni Hozmar, 8.V.21.

Megophthalmus scanicus (Fall.) Barcelona: Ciutat (Pedralbes), 18. V. 20. C. Gèlabert!. Lleida: Lés (Vall d'Arán, 18, IV. 17+30. IX. 18, Pierre Espinasse!

Agallia hispanica Horv. Barcelona: Ciutat (Pedralbes), 5. III. 20. C. Gelabert!; Guardiola de Berga, 29-30. VII. 20.

Agallia venosa (Fall.) Lleida: Lés (Vall d'Arán), P. Espinasse!

Phlepsius binotatus Sign. Maròc: Xauen, 15. V. 21. Sud-Russia, Caucassia, Turquestan. Bona troballa.

Deltocephalus abdominalis (F.) Girona: Setcasas, VIII. 19.

Athysanus stactogalus Fieb. Maròc: Dar Riffien (Ceuta), 22. V. 21; Xauen, 15. V. 21.

Athysanus limbatus Ferr. Barcelona: Guardiola de Berga, 29-30, VII. 20. Citat de Fransa i Suïssa allí únicament. Bona troballa.

Thamnotettix dilutior (Kbm.) Maròc: Cabo Espartel, 29. IV. 21. Europa central i del Sud, Sibèria. Bona troballa.

Thamnotettix cruentatus (Pnz.). Barcelona: Guardiola de Berga, 29-30. VII. 20.

Cicadula fasciifrons (Stal) Maròc: Tetuán, 2. V. 21. Europa central, Illes Canàries, Japó; Regió Neàrtica. Bona troballa.

Cicadula sexnotata (Fall.) Maròc: Cabo Espartel, 29. IV. 21; Rincón-Médik, 6. V. 21.

Eupteryx collina (Fl.) Maròc: Xauen, 15. V. 21. Europa, Turquestán; Regió Neàrtica. Bona troballa.

Eupteryx putoni Leth. Maròc: Cabo Espartel, 29. IV. 21. Europa, Caucàs, Persia. Bona troballa.

Typhlocyba Lethierryi Edw. Lleida: Lés (Vall d'Arán), 30. XI. 16. P. Espinasse!

Cixius nervosus (L.) Girona: Camprodón, VIII. 19.

Duilius (Hemitropis) bipunctatus (Fieb.) Maròc: Dar-Riffien (Ceuta), 22. V. 29. Espanya, Sicília, Alger, Tunísia.

Falcidius apterus (F.) Maròc: Tánger, 28. IV. 21. Sud Europa, Alger.

Hysteropterum grylloides (F.) Barcelona: Guardiola de Berga, 29-30, VII. 20.

Hysteropterum maculifrons M. R. Barcelona: Santa Coloma de Gramanet, 21. V. 18. Sagarra (I)!

Tettigometra picta Fieb. Barcelona: Castelldeféls, 24. V. 17, Sagarra (I)!

Heteroptera

Ochetostethus nanus (H. S.) Lleida: Vall d'Arán.

Odontotarsus grammicus (L.) Lleida: Cervera, 18. VII. 15, Vila!

Loxocnemis dentator (F.) Barcelona: Castelldeféls, 20. V. 15.

Coriomeris hirticornis (F.) Barcelona: entorns Ciutat, 24. X. 15.

Strobilotoma typhaecornis (F.) Barcelona: entorns Ciutat, 20. X. 15.

Lyorhyssus hyalinus (F.) Barcelona: Gavá - Begas, 1. VII. 15; Manresa, 28. VII. 14.

Corizus subrufus (Gmel.) Barcelona: Manresa, 28. VII. IV. Lleida: Seu d'Urgell, 22. VII. 16.

Corizus parvumpunctatus (Schill.) Lleida: Lés (Vall d'Aràn). 21. IX. 13, P. Espinasse!

Stictopleurns crassicornis (L.) Barcelona: Castelldefels, 3. V. 15. Lleida: Coll-Fret (Artesa de Segre), 27. V. 16. Maluquer (Joaq.)!

En la *Liste de quelques Hémiptères recueillis au Maroc* por Ernest de BERGÉVIN, publicada en el Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord, T. VII, n.º 8, 15 Novembre de 1916, p. 314-315, es citen alguns Homópters, les localitats esmentades allí no són cap de les de la present llista.

Anotacions a la lepidopterologia ibèrica

III (1)

Formes noves dignes d'esment

per

Ignasi de SAGARRA

Brenthis ino Rott. rassa **orilda**, nova rassa.

Difereix de la rassa típica de l'Europa central, pel major esclat de coloració amb tonalitat més càlida tan en l'anvers com al revers de les ales. Li és característica també, la reducció del pigment negre, particularment en la regió basilar del anvers de les ales, demés del dibuix total que esdevé més gràcil en alguns indrets. Mides semblants a les que assoleix la rassa típica.

Tipus de Oriuela del Tremedal (Aragó) 1700 mts. alt. (Querci leg. 14-VII-241.) [En la col. del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.]

Brenthis ino Rott. rassa **pyrenaica**, nova rassa.

Es la rassa més robusta d'Europa, entre totes les que coneixem.

Mides bon tros més grans que les de la rassa típica (40 mm. d'expansió alar, en el mascle; 42 mm. d'expansió alar, en la femella). Contribueix a la caracterització racial el marcat melanisme que s'acusa particularment en la meitat basilar de l'anvers de les femelles.

(1) Vegeu: BUTLL. INST. CAT. HIST. NAT., pàg. 45 49.-1925.