

venientes del nucléolo tendrían más bien una influencia sobre las fases cariocinéticas, regulando la distribución de la cromatina y manteniendo la constante especialidad de los coloides cromáticos y contrarrestando la influencia de medio.

Antes de terminar este trabajo de investigación de los corpúsculos de referencia, queremos hacer resaltar un punto, y es que su estudio comparativo entre preparaciones fijadas y teñidas por HEINDENHAIN y en las observadas en fresco, parece acusar en éstas un predominio de número de estos corpúsculos sobre aquéllas. Si es así y nuestras observaciones han sido bien interpretadas, deberíamos inquirir la causa de esta disminución. No es fácil admitir que los reactivos del material fijado los hayan disuelto completamente. Más bien nos deberíamos inclinar o interpretar el fenómeno, suponiendo diversos estados fisiológicos de los corpúsculos de manera que unos en virtud de este especial estado tendrían más afinidad, por la hemotoxilina férrica de HEINDENHAIN y por lo mismo se teñirían como los cromosomas y los otros quedarían sin teñir.

---

---

## Pseláfidos y Scidménidos Catalanes

III

por

R. ZARIQUIEY y ALVAREZ

Desde mayo de 1917 (1) que publiqué en este BOLETÍN, con el mismo título, la lista segunda de estos interesantes coleópteros, otras capturas me permiten dar ahora nuevas localidades catalanas que en su mayoría són las primeras citadas de esta región cuando no son los primeros datos de localidades precisas para conocer su zoogeografía ibérica.

El conocido especialista señor A. DODERO a visto los insectos y puesto los nombres con su amabilidad acostumbrada cuando ha sido preciso para su determinación exacta.

---

(1) I. Febrer-Març, p p. 27-30, 1917; II. Maig, p p. 59-61, 1917.

## Pselaphidae

*Batrisodes oculatus* Aubé 1 ♂. Alrededores de la Garriga (Barcelona) en uno de los torrentes que atraviesan la carretera que va hacia Samalús, el día 7-VI-17, bajo una piedra. 1 ♂, en un tiesto de geranio, en un jardín del Barrio de la Salud (Ciudad), 15-VII-17, (Codina).

*Trimium minimum* Dod. 1 ej. la misma localidad y la misma fecha primeras.

*Amauronys Doderoi* Norm. 1 ej. cogido junto al río Aiguadora, bajo una gran piedra, alrededores de Llinás, 11-VII-22 (Bergadá) (citado ya por mí de Capdella, VIII-165).

*Brachygluta Guillemardi* Saulcy (veris). Altafulla, 5-V-18.

*Brachygluta Cartagenica* Saulcy. ♂♂♀♀. Can Túnis, 2-11-18 (Ciudad).

*Pselaphus Heisei* Herbst. Citado ya del valle de Arán. Cogido bajo las hojas secas en gran número de ejemplares en Arenys de Munt (Barcelona) en VII-17.

*Pselaphus longipalpis* Kiesw. 1 ♀. Valle de Sta. Fé, en el Montseny, VII-22.

*Tychus tuberculatus* Aub. 1 ♂ var. ?. Rocallaura, VII-19. (Lérida) (Mas de Xaxars, leg.).

*Tychus Jacquelinii* Boild. 1 ♀ var. ?. Sierra de la Almuzara cerca del Avenc de la Febró, XII. 18 (Tarragona).

## Scidmaenidae

*Neuraphes Titan* Reitt. 1 ♀ (veris) de la Garriga, 7-VI-17.

*Neuraphes strictus* Fairm. Un nuevo ejemplar algo mayor de Figueras, VIII-17 (Gerona).

*Stenichnus cordicollis* Kiesw. 1 ej. de La Garriga, 17-VI-17; otro ejemplar, variedad muy pálida de Altafulla, 5-V-18.

*Euconnus cornutus* 1 ej. de Valls (Tarragona), 28-IV-18.

---

---