

Observaciones malacológicas

V

Moluscos de una excursión colectiva al Ripollés

por

Juan Bta. de AGUILAR-AMAT

Castellcir (Barcelona)*Hyalinia (Polita) nitens* Gml. — 1 ejemplar.*Carthusiana carthusiana* (Müll.) — 2 ejemplares.*Cryptomphalus aspersus* (Müll.) — 1 ejemplar recién salido del huevo.*Abida polyodon* (Drap.) 2 ejemplares.*Abida braunii* (Rossm.) — 2 ejemplares.*Pupilla muscorum* Müll. — 2 ejemplares.*Zua subcylindrica* L. — 1 ejemplar.*Succinea elegans* Risso. — 7 ejemplares.*Lymnaea (Galba) truncatula* Müll. — 10 ejemplares.*Planorbis (Paraspira) spirorbis* L. — 1 ejemplar.**Moyá, La Moratona** (Barcelona).*Carthusiana carthusiana* (Müll.) — 2 ejemplares.*Theba strigella ruscínica* (Bgt.) — 1 ejemplar.*Xerophila arigonis* (Rossm.) — 1 ejemplar.*Chilotrema lapicida andorríca* (Bgt.) — Varios ejemplares, la mayoría jóvenes.*Pseudotachea splendida* (Drap.) — 7 ejemplares jóvenes.*Chondrula quadridens* (Müll.) — 1 ejemplar.*Abida polyodon* (Drap.) — 3 ejemplares.*Chondrina bigorrensís tenuimarginata* (Des M.) — Muchos ejemplares.**San Quirico de Besora** (Barcelona).*Abida polyodon* (Drap.) — 1 ejemplar en las rocas de la carretera de Ribas.*Chondrina bigorrensís tenuimarginate* (Des M.) — Muchos ejemplares en la misma estación que la especie anterior.*Sandhalia cylíndrica* (Mich.) — 2 ejemplares juntos con los precedentes.

Montesquiú

Testacella haliotide Drap.—Pocos ejemplares en el bosque del Castillo.

Testacella scutulum Sow.—Varios ejemplares junto con la anterior Citada por mi en 1918 como *T. companyoi* Dup.

Hyalinia (Polita) lucida Drap.—Junto al río, debajo de las piedras y en la trinchera de la vía férrea. Algunos ejemplares pueden referirse a la forma *farinesi* Bgt.

Hyalinia (Polita) nitens Gml.—2 ejemplares en la «Baga de Planesas».

Hyalinia (Vitrea) crystallina (Müll.).—En el bosque del Castillo, entre la hojarasca y los musgos.

Pyramidula rupestris (Stud.).—En las rocas calizas del desmonte de la vía férrea y de la carretera.

Xerophila arigo (Rossm.).—Común en el pueblo, en la fábrica de carburo y en el jardín del Castillo. *X. arigo subarigo* Fag., citada por mi en 1918 no puede conservar categoría distinta de *X. arigo* pues sus caracteres no traspasan los límites de la variabilidad individual.

Candidula barcinonensis ribasica (Fag.)—En la carretera; citada por mi en 1918 como forma de *caperata*, Mont., que no vive en Cataluña.

Candidula rugosiuscula monistrolensis (Fag.)—En los céspedes del pueblo y de la colina del Castillo.

Carthusiana carthusiana (Müll.).—Común en el pueblo, en la trinchera de la vía férrea y en la colina del Castillo.

Hygromia limbata odeca (Bgt.)—Abundante en la trinchera de la vía férrea.

Theba strigella ruscínica (Bgt.)—Abundante en el pueblo, en la trinchera de la vía férrea y en la colina del Castillo.

Trigonostoma obvoluta (Müll.)—3 ejemplares en la «Font d'en Codineta».

Chilostoma squammatina (Fér.)—En la colina del Castillo y en la «Baga de Planesas».

Chilotrema lapicida andorrica (Bgt.)—Común en todo el término; abundan los ejemplares de la var. *flammulata* y en el jardín del Castillo los ejemplares albinos.

Pseudotachea splendida (Drap.)—Común en todo el término; junto con la forma típica se encuentran las variedades de coloración *sarratia*, *tersonia* y *dunalia* M.-T. y una bonita variedad 1 que tiene las líneas 1, 2, 3 y 5 reducidas a puntos, la 4 bien visible, y el fondo de la concha de color de nanquín, variedad para la que propongo, por no haberla visto citada,

- el nombre de *navasia*, dedicándola al R. P. Navás, preclaro entomólogo y compañero de excursión.
- Cepaea nemoralis* (L.)—En la colina del Castillo; el tipo y la var. *libellula* Risso, esta más abundante.
- Cryptomphalus aspersus* (Müll.)—Únicamente en el jardín y huerto del Castillo; pero abundante.
- Buliminus (Zebrinus) detritus* (Müll.)—En la colina del Castillo; no muy frecuente
- Rumina decollata* (L.)—En la trinchera de la vía férrea y en la colina del Castillo.
- Chondrula quadridens* (Müll.)—Debajo de las piedras y en la trinchera de la vía férrea.
- Abida polyodon* (Drap.)—En las rocas de la carretera y de la vía férrea y en la «Baga de Planesas».
- Abida braunii* (Rossm.)—Junto al río debajo de las piedras y en las rocas de la vía férrea.
- Chondrina bigorriensis tenuimarginata* (Des M.)—En las rocas de la carretera, de la vía férrea y de la colina del Castillo; en la «Baga de Planesas».
- Sandhalia cylindrica* (Mich.)—En las rocas de la carretera y de la vía férrea y en la «Baga de Planesas».
- Kuzmicia pyrenaica* (Charp.)—En los lugares umbrosos y en la colina del Castillo, entre la hiedra.
- Kuzmicia abietina* (Dup.)—Debajo del puente del canal y en la riera de la Solana.
- Kuzmicia nigricans* (Pult.)—En el bosque del Castillo.
- Pomatias elegans* (Müll.)—Común en todo el término, siendo frecuentes los ejemplares de forma *soluta*, como ya indiqué en 1918.

La Farga de Bebié.

- Xerophila arigoi* (Rossm.)—Muy abundante.
- Pseudotachea splendida* (Drap.)—Ejemplares de la forma tipo.
- Cepaea nemoralis libellula* Risso.—Junto al río.
- Buliminus (Zebrinus) detritus* Müll.—Muy abundante en la subida a San Muhi.

Llaers, Bufadors de Babí.

- Testacella haliotidea* Drap.—1 ejemplar.
- Testacella sentulum* Sow.—1 ejemplar.
- Vitrina (Phenacoluma) major* Fér.—1 ejemplar.
- Hyalinia (Polita) lucida* Drap.—3 ejemplares.
- Hyalinia (Polita) nitens* Gml.—1 ejemplar.

- Pyramidula rupestris* (Stud.)—1 ejemplar.
Gonyodiscus rotundatus (Müll.)—5 ejemplares.
Theba strigella ruscínica (Bgt.)—4 ejemplares.
Carthusiana carthusiana (Müll.)—3 ejemplares.
Hygromia limbata oteca (Bgt.)—Muchos ejemplares.
Trigonostoma obvoluta (Müll.)—Muchos ejemplares.
Chilotrema lapicida andorríca (Bgt.) Muchos ejemplares muy abundantes los de la variedad *flammulata*.
Chilostoma squammatina (Fér.)—Muy abundante y un ejemplar albino.
Pseudotachea splendida (Drap.)—Un ejemplar de la variedad *sphacelata* W. et B.
Abida polyodon (Drap.)—Muchos ejemplares.
Abida affinis catalónica (Bof.)—Un ejemplar
Chondrina bigorriensis tenuimarginata (Des M.)—Muchos ejemplares.
Sandhalia cylíndrica (Mich.)—7 ejemplares.
Marpessa laminata (Mont.)—4 ejemplares; esta localidad confirma las citas de Chía, Fagot i Salvañá de *Clausilia laminata* Mont. en las cuencas del Ter y del Fluviá.
Kuzmicia abietina (Dup.)—Muchos ejemplares.
Kuzmicia nigricans (Pult.)—Muchos ejemplares.
Pirostoma ventriosa (Drap.)—Cinco ejemplares; esta localidad añadida a las ya conocidas de Camprodón y Pla Traver confirma una vez más la presencia de esta especie en el Pirineo Catalán.
Cochlostoma obscurum esseranum (Fag.) -Muchos ejemplares.

Santa María de Besora

- Chilostoma squammatina* (Fér.)—Un ejemplar en la subida del Cas tillo.
Chondrina bigorriensis tenuimarginata (Des M.)—Muchos ejemplares junto con el anterior.

Bellmunt (1075 metros sobre el nivel del mar).

- Hyalinia (Polita) nitens* (Gml.)—3 ejemplares en el camino de Vidrà a la ermita.
Hyalinia (Zitoiondes) nitida (Müll.)—Un ejemplar en el camino de la «Font Viva».
Gonyodiscus rotundatus (Müll.)—5 ejemplares en la subida a la ermita y en el camino de la «Font Viva».
Carthusiana carthusiana (Müll.)—Un ejemplar en la subida a la ermita.

- Hygromia limbata oteca* (Bgt.)—Un ejemplar en la subida a la ermita.
- Trigonostoma obvoluta* (Müll.)—5 ejemplares en la subida a la ermita y en el camino de la «Font Viva».
- Chilostoma lapicida alicorica* (Bgt.)—Muchos ejemplares en la subida a la ermita, la mayoría de la var. *flammulata*.
- Chilostoma squammatina* (Fér.)—Muchos ejemplares en la subida a la ermita y en la plataforma, entre la hiedra.
- Chilostoma pyrenaica* (Drap.)—Un ejemplar en la subida a la ermita; esta captura parece ser la de localización más meridional conocida hasta ahora.
- Pseudotachea splendida* (Drap.)—13 ejemplares; 3 de la forma tipo, 5 de la var. *tersonia* M.-T. y 5 de la var. *sphacelata* Webb. & B. Todos en la subida a la ermita.
- Cepaea nemoralis libellula* (Risso.)—1 ejemplar en la subida a la ermita.
- Buliminus (Zebrinus) detritus* (Müll.)—2 ejemplares en la subida a la ermita.
- Abida variabilis* (Drap.)—Un ejemplar que confirma la existencia de esta especie, puesta en duda por Chia y por Bofill, Haas y Aguilar-amat.
- Abida affinis catalonica* (Bof.)—2 ejemplares; en la plataforma de la ermita y en el camino de S. Pedro de Torelló.
- Chondrina bigorriensis tenuimarginata* (Des M.)—Muchos ejemplares en la plataforma de la hermita y en el camino de S. Pedro de Torelló.
- Balea perversa* (L.)—2 ejemplares en la plataforma de la ermita entre la hiedra.
- Sandhalia cylindrica* (Mich.)—2 ejemplares en el camino de la ermita.
- Marpessa laminata* (Mont.)—Un ejemplar en la subida a la ermita.
- Kuzmicia gallica* (Bgt.)—Varios ejemplares en la subida a la ermita; queda pues comprobada la cita de Salvañá y las siguientes de Chia y de Fagot.
- Kuzmicia abietina* (Dup.)—Varios ejemplares en la subida a la ermita.
- Kuzmicia nigricans* (Pult.)—Muchos ejemplares en la subida a la ermita, en la plataforma de la misma y en el camino de la «Font Viva».
- Pirostoma ventricosa* (Drap.)—4 ejemplares en la subida a la ermita.
- Cochlostoma obscurum esseranum* (Fag.)—Muchos ejemplares en la subida a la hermita.
- Pomatias elegans* (Müll.)—Un ejemplar en la subida a la ermita.

De Vidra a Ciuret.

- Carthusiana carthusiana* (Müll.).—3 ejemplares.
Candidula rugosiuscula monistrolensis (Fag.)—Un ejemplar.
Pseudotachea splendiaa (Drap.).—2 ejemplares de la forma típica.
Cepaea nemoralis (L.).—2 ejemplares de la forma *libellula* Risso.
Abida polyodon (Drap.)—Varios ejemplares en las rocas del camino.
Chondrina bigorriensis tenuimarginata (Des M.).—Varios ejemplares junto con la anterior
Kuzmicia nigricans (Pult.).—Un ejemplar.

El Grau de la Donzella.

- Theba strigella ruscinea* (Bgt.).—Un ejemplar entre el musgo.
Chilostoma squammatina (Fér.).—Un ejemplar joven.
Kuzmicia abietina (Dup.).—Varios ejemplares entre el musgo.
Kuzmicia nigricans (Pult.).—Muchos ejemplares junto con la anterior.

Ciuret (970 metros sobre el mar).

- Gonyodiscus rotundatus* (Müll.).—2 ejemplares bajo las piedras.
Hygromia limbata oteca (Bgt.).—3 ejemplares entre la maleza.

Pla Traver (1250 metros sobre el nivel del mar).

- Hyalinia (Polita) nitens* (Gml.).—2 ejemplares
Carthusiana carthusiana (Müll.).—3 ejemplares.
Hygromia limbata oteca (Bgt.).—Un ejemplar.
Chilotrema lapicida andorraca (Bgt.).—2 ejemplares.
Chilostoma pyrenaica (Drap.).—Un ejemplar en las rocas de los acantilados.
Cepaea hortensis hortensis (Müll.).—2 ejemplares.
Cepaea hortensis baudonia (M.-T.).—2 ejemplares.
Cepaea hortensis filholia (M.-T.).—Un ejemplar.
Abida variabilis (Drap.).—2 ejemplares de esta especie citada ya por Morer en 1879 en su «Historia de Camprodón» según ejemplares de dicha localidad clasificados por Bofill y Poch.
Kuzmicia nigricans (Pult.).—Muchos ejemplares.
Kuzmicia abietina (Dup.).—Muchos ejemplares.