

Aspl. germanicum Weiss. Montolivet, la Garrinada. Aquesta interessantíssima espècie, considerada com un híbrid de l'*Aspl. septentrionale* amb l'*Aspl. Trichomanes*, vaig descobrir-la per primera volta el 1925, en dos llocs diferents. El lloc on primer vaig trobar-la és al cràter de Montolivet, en un indret del seu llavi en què s'ha després un bloc de bassalt que forma una individualitat independent; en aqueixa roca creixen abundantment els *Aspl. septentrionale*, *Adiantum-nigrum* i *Trichomanes*. Barrejats entre aquestes plantes, es presenten tres o quatre peus d'*Aspl. germanicum*.

L'altre indret és un lloc de les penyes del costat esquerre de la Garrinada, el mateix on creix la *Notholena Maranthae*; vaig trobar-hi un sol peu.

Equisetum trachyodon Al. Br., (*E. occidentale* Hy). Marges del Fluvià, prop de can Basil.

L'*Auricularia mesenterica* (Dicks) Fr. (*A. tremelloides* Bull.) a Sant Sadurní d'Anoia

per

TIMOTEU BOTEY

En una excursió que férem el 3 de maig d'enguany a la susdita població, amb els alumnes de l'Institut de Vilafranca del Penedès, trobàrem l'esmentat fong, que és nou per a la nostra flora. Es desenrotllava amb gran exuberància tot a l'entorn d'una soca de *Populus nigra* tallada arran de terra, entre una filera que n'hi ha darrera del mur de la finca de can Codorniu. Probablement devia ocasionar la mort de l'arbre atacat, ja que segons BOURDOT i GALZIN, els mata ràpidament. Pel seu marge lobulat, sembla que es tracta de la varietat *lobata* (Sommf.) Quélet.