

## II

El *Cheiridium museorum* Leach, a Catalunya

Aquest fals escorpi va ésser trobat per primera volta per CUNÍ a Calella el 1897 i classificat per E. SIMON; amb posterioritat no havia estat retrobat. NAVÀS en la seva Sinopsi dels Quernets de la Península Ibèrica es refereix solament a la cita de CUNÍ, i en FERNÁNDEZ NONÍDEZ en la seva Monografia Pseudoscorpiones de España, igualment hi fa constar que, encara que comú en altres països, no ha estat afortunat en la troballa.

En l'excursió realitzada a Riells el mes de febrer passat, en les balmes de Coll d'Aros, en detritus sota unes pedres, el consoci ESPAÑOL va trobar 5 exemplars d'aquesta interessant espècie única del gènere *Cheiridium*: 1 mascle i 4 femelles.

## III

La *Gluvia dorsalis* Latr. (Solífug) a Catalunya

L'ordre dels Solífugs, que en el N d'Àfrica està representat per nombroses espècies, queda reduït a Espanya a aquesta sola espècie.

Abundant al S i Centre d'Espanya, la cita més septentrional era fins a la data la del Dr. HAAS, de Flix: 1 mascle i 1 femella.

(Scorpione und Solifugen aus dem nordlichen und ostlichen Spanien von Dr. WERNER in Wien) Senckenbergiana, Nov. 1925, part 6, p. 209.

En una excursió realitzada pel juliol del 1933 amb el Dr. FONT i el Sr. A. VILARRÚBIA vàrem trobar 1 femella a Almatret sota d'una pedra, 1 femella a Puigverd de Lleida i 3 exemplars joves a Margalef (Lleida).

Aquestes localitats i la de Balaguer, segons ha estat observat pel Dr. FONT, permeten estendre l'àrea de dispersió geogràfica d'aquest interessant i únic Solífug peninsular.

*Laboratori d'Aracnologia del  
Museu de Catalunya*