

VI

El *Bledius furcatus* (Staphylinidae) a Catalunya

De totes les localitats catalanes explorades fins avui, cap no m'ha donat un percentatge tan elevat d'espècies interessants com els aiguamolls salins de la platja de Sant Vicenç de Calders.

Estimulat per l'èxit assolit en la meua primera exploració entomològica per aquells indrets (veure nota publicada en el But. Ins. Cat. Hist. Nat., any 1932, N. 1-2-3, pàg. 48), vaig determinar fer-n'hi una altra, que em resultà també altament satisfactòria.

Entre el material recollit ressalten per llur forma original unes sèries de *Bledius furcatus* Ol., estafilínid, propi de l'Europa central, països mediterranis i Caucas, segons M. BERNHAUER i K. SCHUBERT (*Coleopterorum Catalogus*, Pars 29, pàg. 130).

L'esmentat insecte, fins avui, no havia estat assenyalat de Catalunya, car les úniques localitats espanyoles en les quals s'havia observat, segons el catàleg de LAFUENTE, eren Ciudad-Real i Càdiz, i la cita Pireneus orientals de GAVOY (entomòleg resident a Carcassona) ha d'interpretar-se dels Pireneus francesos.

Convivint amb la forma tipus, es troben molts exemplars de la varietat *skrimshiranus* Curt., nova també a Catalunya, ja que solament ha estat citada de Ciudad-Real (LAFUENTE) i Balears (BREIT).

Els individus de la varietat objecte d'estudi abunden en els aiguamolls salins, sota les pedres mig submergides, on construeixen galeries a la manera dels *Dischirius* i volen cap al tard, de vegades en gran nombre, junt amb els altres estafilínids i heterocèrids.