

Sobre la presencia de *Tursiops truncatus* (Montagu) en Menorca

por

E. CASTAÑOS

El día 23 de enero último, fué encontrado varado y vivo en el arenal de Punta Prima (SE de Menorca) un hermoso ejemplar del *Tursiops truncatus* (Montagu), el que tardó una hora y media en morir, desde que fué descubierto por un pescador.

Por no ser frecuente la presencia de Cetáceos en las costas menorquinas (1) y sobre todo por tratarse de un Delfínido que no ha sido observado en Menorca, por lo menos desde hace muchos años (ya que BARCELÓ y COMBIS (1875) lo cita (2) como de Baleares), creo conveniente ponerlo en conocimiento de la INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL.

Dicho cetáceo presentaba una herida en la parte dorsal, a unos veinte centímetros de la aleta de dicho sitio, pero al parecer sin importancia. Como enfrente de Punta Prima se encuentra la Punta del Aire, es muy probable que el animal, ofuscado por la luz del faro, se encontrase inopinadamente con el arenal donde quedó varado.

CABRERA LATORRE, en su notable obra sobre mamíferos españoles, asigna a esta especie una longitud de 250-310 cm. La encontrada en Menorca, cuyas medidas he tomado con la mayor exactitud posible, presenta 340 cm de longitud total. Se trata, pues, de ejemplar de mayores dimensiones que las anotadas en la mencionada obra de CABRERA.

(1) J. B. D'AGUILAR AMAT en su obra: *Dades per un catàleg dels mamífers de Catalunya* (Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona) cita los siguientes cetáceos: *Globicephalus melas* (Traill). — *Ziphius cavirostris* G. CUVIER. — *Physeter catodon* (Linné). — *Balaenoptera physalus* (Linné). — *B. acuto rostrata* (Lacépède).

No será aventurado suponer que el *Tursiops* se aproxima también por la costa catalana.

(2) F. BARCELÓ y COMBIS, *Apuntes para la fauna balear*. Anal de la Soc. Esp. de Hist. Nat., Tomo IV, 1875. - Catálogo metódico de los mamíferos observados en las islas Baleares. — Dice a propósito de ésta especie «...se aproxima raramente a estas costas; pero nuestras parejas lo encuentran con bastante frecuencia a largas distancias de las mismas.

Con objeto de que pueda verse la diferencia de las medidas exteriores, con las de otro macho adulto encontrado en Valencia y descrito por CABRERA (1), las expondré en dos columnas:

Fórmula dentaria $\frac{21-21}{21-21}$. Los dientes de la punta rotos.

	Ejemplar de Valencia	Ejemplar de Menorca
Longitud total.	278 cm	340 cm
Distancia desde el extremo del pico a la base de la aleta dorsal	119 »	133 »
Longitud del pico desde la comisura de la boca	28 »	35'5 »
Longitud de la aleta dorsal en la base .	41 »	53 »
Borde anterior de la misma	47'5 »	46 »
Aleta pectoral en el borde anterior. .	44'5 »	48 »
Ancho de la aleta caudal.	64'5 »	70 »

Desgraciadamente no he podido tomar las medidas del esqueleto porque cuando estaba preparándose para dejarlo libre de tejidos blandos, fué arrastrado mar adentro durante los pasados temporales.

Mahón, febrero de 1934.

(1) Ob. cit. pág. 356.