

més curiós del cas és que els de la fauna paleàrtica, si bé coincideixen a assenyalar la seva existència a la mediterrània occidental, no el citen ni de Catalunya ni d'Espanya; vegeu, si no, el «Catalogus Coleopterorum Europae, etc.» de HEYDEN, REITTER i WEISE; França meridional i Itàlia, M. PIC, en el volum 41 (dedicat a la família ptinidae) del «Coleopterorum Catalogus» editat per S. SCHENKLING l'assenyala a Portugal, Sicília, Còrsega i Nord d'Africa i finalment, Manuel MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, en el seu catàleg «Los coleòpteros de Marruecos», diu haver-lo recollit a Mogador i a Tànger. La seva existència no té, doncs, res de particular no solament a Catalunya, sinó tampoc a tota la resta d'Espanya.

## III

### Un coleòpter interessant de la Fauna catalana: el *Colobicus marginatus* (colydiidae)

El dia 2 de gener del 1930, trobant-me incidentalment a l'Espluga de Francolí, i disposant d'unes quantes hores, vaig anar a visitar la Font de Nerola. Pels seus voltants vaig tenir la sort de capturar, sota l'escorça d'una alzina, entre altres insectes, un *Colobicus marginatus* Latr., colydiid molt interessant, donada la circumstància d'ésser nou per a la Fauna ibèrica, car la cita «Pireneus orientals» de MAYET, que hom veu en el catàleg LAFUENTE (any 1928), es refereix, sens dubte, als Pireneus francesos.

Fins avui aquest coleòpter era considerat com a propi de l'Europa central, Sibèria i Japó. Així, HEYDEN, REITTER i WEISSE, en el *Catal. Coleop. Europ.* (any 1906 p. 351), l'assenyalen d'Europa (denominació equivalent a Europa Central); CALWER, en la seva obra *Calwers Käferbuch* (any 1916 p. 511), el considera propi de l'Europa central, Sibèria i Japó; i finalment, A. HETSCHKO, en el *Coleopterorum Catalogus* (Pars. 107, any 1930, p. 30), dóna com a bones les localitats de CALWERS, anteriorment esmentades.

Pel que fa referència a la biologia d'aquest curiós insecte, PERRIS descobrí que la larva viu sota les escorces de diferents espècies del gènere *Quercus* i dintre les galeries del *Pyrrhidium sanguineum* i *Phymatodes variabilis*, alimentant-se probablement de les dejeccions de les larves d'aquests cerambícids, i que la nimfosi s'efectua a terra. L'adult, segons ACLOQUE (*Fauna de França*, volum dedicat a

coleòpters, any 1895, p. 222), viu en les escorces i en els bolets; REITTER (Fauna Germanica: Käfer, any 1911, p. 115) dóna com a hàbitat del susdit insecte les escorces d'alzina i roure; i, finalment, KUHNT (Illustrierte Bestimmungs Tabellen der Käfer Deutschland, any 1912, p. 555) afirma que viu amb preferència, durant la primavera, sota l'escorça del faig.

La troballa del *Colobicus marginatus* Latr. a l'Espluga de Francolí confirma una vegada més la gran representació que té a la nostra pàtria la Fauna centroeuropea; i segurament l'estudi d'aquestes petites famílies, tan poc conegeudes actualment a Catalunya, donarà un bon contingent d'espècies a la nostra Fauna coleopterològica.