

Byturus aestivus L.
 » *tomentosus* F.
Satorystia meschniggi Rtt.

Els diferents autors no estan d'acord sobre la seva posició sistemàtica, alguns com Erichson, la colloquen entre els Melyridae; d'altres, con Kiesenwetter, entre els Nitidulidae, Jacquelin du Val amb els Telmatophilidae, i, finalment, Le Conte i molts d'altres la consideren com una subfamília dels Dermestidae.

Hammerschmidt, Bouché, Kiesenwetter, Ganglbauer, Xamheu, Reiter, Korolikhov i tants d'altres s'han ocupat de la biologia de la família Byturidae, especialment del *Byturus tomentosus* F. Per ells sabem que en estat larvari viuen sobre el *Rubus idaeus* i perjudiquen el cultiu d'aquest vegetal; són, per tant, insectes francament perjudicials a l'agricultura; l'adult freqüenta les flors.

Fins avui la família Byturidae no es coneixia a Catalunya. Les cites més pròximes de què disposàvem eren les de Xamheu i Mayet: Pireneus orientals francesos; la de Schaufuss: Balears, i la col·lecció Gorriz: Navarra.

Els CERAMBYCIDAE (Col.) de la Vall d'Aran

Les exploracions de Llenes, Saint Hilaire, etc., ampliades aquests últims anys pels entomòlegs del Museu de Ciències Naturals de la nostra ciutat, han posat de manifest l'extraordinària riquesa de coleòpters fitofags que ens ofereix aquesta comarca pirenenca; riquesa que hom ja tenia prevista tenint en compte l'esponerosa vegetació que vesteix els seus prats i muntanyes. La família *cerambycidae*, per exemple, compta entre els seus representants 89 formes recollides en aquesta comarca, nombre molt superior al que Cuni assenyala de tot Catalunya en el seu catàleg l'any 1876 i que sobrepassa d'unes quantes unitats el que Martorell indicà, també de tot Catalunya, uns quants anys més tard.

Després dels catàlegs de Cuni i de Martorell, cap més treball de conjunt no s'ha fet sobre els cerambycids catalans, malgrat els errors que aquells contenen i les addicions que cal fer-hi. Per tal, doncs, d'estimular els entomòlegs catalans que estudien els nostres cerambycids, avançarem avui aquesta petita contribució a l'estudi dels coleòpters del Nostre Pireneu.

Família CERAMBYCIDAE

Subfamília PRIONINAE

Megopsis (Aegosoma) scabricornis Scop.—Bossost (Llenes).
Prionus coriarius L.—Lés (S. Hilaire); Bosc Bericauba (Espanol).
Tragosoma deψsarium L.—Salardú (Espanol).

Subfamília CERAMBYCINAE

- Spondylis buprestoides* L.—Lés (S. Hilaire).
Asemum striatum L.—Port de la Bonaigua, Estany de Colomers (Espanñol).
Cerambyx scopoli Füssl.—Vall d'Aran (Codina); Portilló (Espanñol).
Hesperophanes cinereus Vill.—Lés (S. Hilaire).
Gracilia minuta F.—Lés (S. Hilaire).
Obrium brunneum F.—Lés (S. Hilaire).
Vesperus strepens F.—Vall d'Aran (Llenes).
Rhagium (s. str.) bifasciatum F.—Vall d'Aran (Llenes); Lés (S. Hilaire, Espanñol); Portilló (Espanñol).
Rhagium (s. str.) mordax Degeer.—Vall d'Aran (Llenes); Lés (S. Hilaire); Bossost (Espanñol).
Rhagium (s. str.) sycophanta Schrank.—Lés (S. Hilaire); Portilló (Codina).
Toxotus cursor L.—Lés (S. Hilaire); Estay de Colomers, Bossost, Portilló (Espanñol).
Acmaeops (s. str.) pratensis Laic.—Estany de Colomers (Espanñol).
 » (*Dinoptera*) *collaris* L.—Lés (S. Hilaire).
Cortodera femorata F.—Lés (S. Hilaire).
Grammoptera ruficornis F.—Lés (S. Hilaire).
Alosterna tabacicolor Degeer.—Lés (S. Hilaire); Bosc de Bericauba (Espanñol).
Leptura (Anoplodera) rufipes Schall.—Lés (S. Hilaire); Salardú (Espanñol).
Leptura (Anoplodera) sexguttata F.—Lés (S. Hilaire).
Leptura (Vadonia) livida F.—Salardú (Espanñol).
Leptura (s. str.) dubia Scop.—Lés, Bossost, Portilló (Espanñol).
Leptura (s. str.) fulva Degeer.—Viella (S. Hilaire); Salardú, Arros, Lés (Espanñol).
Leptura (s.str.) hybrida Rey.—Port de la Bonaigua, Estany de Colomers, Tradós (Espanñol).
Leptura (s. str.) maculicornis Degeer.—Vall d'Aran (Codina).
Leptura (s. str.) rubra L.—Vall d'Aran (Llenes); Viella (S. Hilaire); Arties, Bossost (Espanñol).
Leptura (s. str.) rubra ab. *occipitalis* Muls.—Vall d'Aran (Llenes); Viella (S. Hilaire).
Leptura (s. str.) sanguinolenta L.—Salardú, Estany de Colomers, Les (Espanñol).
Leptura (s. str.) scutellata F.—Portilló (S. Hilaire, Espanñol); Bossost, Lés (Espanñol).
Leptura (s. str.) stragulata Germ.—Vall d'Aran (Codina).
Leptura (s. str.) trisignata Fairm.—Vall d'Aran (Codina).
Leptura (s. str.) virens L.—Salardú (S. Hilaire).
Judolia cerambyciformis Schrank.—Vall d'Aran (Llenes); Lés (S. Hilaire, Espanñol); Salardú, Bosc de Bericauba, Portilló (Espanñol).
Strangalia (Sphenalia) pubescens F.—Vall d'Aran (Llenes).

Strangalia (Sphenalia) pubescens v. *auriflua* Redt.—Vall d'Aran (Llenes).

Strangalia (Sphenalia) revestita L.—Lés (S. Hilaire).

Strangalia (s. str.) aurulenta F.—Lés (S. Hilaire); Bossost (Espanol).

Strangalia (s. str.) bifasciata Mull.—Lés (S. Hilaire, Espanol); Arros, Bosc de Bericauba, Portilló (Espanol).

Strangalia (s. str.) maculata Poda.—Vall d'Aran (Llenes, Bofill); Lés (S. Hilaire, Espanol); Salardú, Arties, Arros, Portilló (Espanol).

Strangalia (s. str.) melanura L.—Lés (S. Hilaire, Espanol); Port de la Bonaigua, Estany de Colomers, Salardú, Arties, Arros, Bosc de Bericauba, Portilló (Espanol).

Strangalia (s. str.) nigra L.—Vall d'Aran (Bofill).

Strangalia (s. str.) quadrifasciata L.—Port de la Bonaigua (Espanol).

Stenopterus rufus L.—Lés (S. Hilaire); Portilló (Espanol).

Molorchus umbellatarum Schreb.—Lés (S. Hilaire).

Deilus fugax Ol.—Lés (S. Hilaire).

Aromia moschata L.—Lés (S. Hilaire, Espanol).

Rosalia a'pina L.—Vall d'Aran (Llenes); Lés (S. Hilaire).

Hylotrupes bajulus L.—Vall d'Aran (Llenes, Codina); Lés (S. Hilaire); Salardú, Bosc de Bericauba (Espanol).

Hylotrupes bajulus ab. *lividus* Muls.—Lés (S. Hilaire); Salardú (Espanol).

Pyrrhidium sanguineus L.—Lés (S. Hilaire).

Phymatodes alni L.—Vall d'Aran (Llenes).

Clytus arietis L.—Vall d'Aran (Llenes); Lés (S. Hilaire); Salardú, Portilló (Espanol).

Clytus tropicus Panz.—Lés (S. Hilaire).

Plagionotus arcuatus L.—Lés. (S. Hilaire).

Plagionotus arcuatus ab. *reichei* Thoms.—Lés (S. Hilaire).

Chlorophorus figuratus Scop.—Lés (S. Hilaire).

Chlorophorus pilosus Forst.—Lés (S. Hilaire).

Chlorophorus trifasciatus F.—Vall d'Aran (Llenes).

Chlorophorus varius Mull.—Lés (S. Hilaire).

Anaglyptus mysticus L.—Lés (S. Hilaire).

Purpuricenus kohleri L. ab *ruber* Geoffr.—Lés (S. Hilaire).

Subfamília LAMIINAE

Parmena balteus L.—Vall d'Aran (Bofill).

Dorcadion fuliginator L.—Vall d'Aran (Llenes); Lés (S. Hilaire, Espanol); Port de la Bonaigua, Salardú, Bosc de Bericauba (Espanol).

Dorcadion fuliginater v. *ovatum* Sultz.—Vall d'Aran (Llenes, Codina).

Dorcadion fuliginater v. *meridionale* Muls.—Lés (S. Hilaire).

Dorcadion fuliginater v. *pyrenaicum* Germ.—Vall d'Aran (Bofill); Salardú (Español).

Dorcadion fuliginater v. *navaricum* Muls. Lés (S. Hilaire).

Morimus asper Sulz.—Vall d'Aran (Llenes); Lés (S. Hilaire).

Lamia textor L.—Lés (S. Hilaire).

Monochamus sutor L.—Vall d'Aran (Bofill).

Mesosa nebulosa F.—Lés (S. Hilaire).

Anaethetis testacea F.—Lés (S. Hilaire).

Pogonocherus (Pityphilus) fasciculatus Degeer.—Lés (S. Hilaire).

Pogonocherus (s. str.) hispidulus Piller.—Lés (S. Hilaire).

Acanthoderes clavipes Schrank.—Lés (S. Hilaire); Bosc de Bericau-
ba (Español).

Acanthocinus aedilis L.—Vall d'Aran (Llenes); Estanys de Colo-
mers (Español).

Exocentrus lusitanus L.—Lés (S. Hilaire).

Agapanthia dahli Richt.—Lés (S. Hilaire).

Agapanthia villosoviridescens Degeer.—Lés (S. Hilaire).

Agapanthia violacea F.—Lés (S. Hilaire).

Saperda carcharias L.—Lés (S. Hilaire).

Saperda octopunctata Scop.—Lés (S. Hilaire).

Saperda scalaris L.—Vall d'Aran (Llenes).

Oberea oculata L.—Salardú (Español).

Phytoecia (s. str.) cylindrica L.—Salardú (Español).

Phytoecia (s. str.) nigricornis F.—Salardú (Español).

Phytoecia (Opsilia) coeruleascens Scop.—Lés (S. Hilaire).

Tetroops praesta L.—Lés (S. Hilaire).

Barcelona, abril del 1935.