

Addenda et corrigenda in genere ALLANTUS Jur

a

O. CONDE, Riga

- 1 (4) Feminis posterioris parte exteriori flava.
- 2 (3) Serra ♀ dentibus numerosis et minutissimis armata (fig. 3); scutellum magis minusve globosum (fig. 2). Mesopleuris nigris.
- a. Segmentum primum antennarum nigrum. ♀ scutello flavo, mesopleuris nigris aut macula minima flava ornatis. ♂ hipopygio nigro, margine posteriore flavo... *Rufoniger* André typicus
- b. Segmentum primum antennarum magis minusve flavum. ♀ scutello nigro, mesopleuris triangulo flavo ornatis. ♂ hypopygio pallido. Sculptura a praecedente non differt.
 Forma *dusmeti* Knw. (*sabariensis* Mocs?)
- 3 (2) Serra dentibus robustis minus copiosis armata (fig. 5); scutellum deplanatum (fig. 1). Mesopleuris ♂ triangulo flavo et scutello interdum macula flava ornatis.
antigae Knw. (*baeticus* Spin?, *scutellaris* Enst?)
- 4 (1) Feminibus posterioribus aut nigris, aut parte interiore (=posteriore) et exteriori medio copiosissime nigratis.
- 5 (6) Capite thoraceque densissime punctatis et rugosis, antennis nigris. ♀ mesopleuris nigris, segmento 1. dorsali flave marginato. ♂ capite poene oculos angustato. Serra ut fig. 5.
balteatus Kriechb.
- 6 (5) Capite thoraceque subtiliter et sparsim punctato, nitido. Segmento 1. antennarum (interdum etiam secundo) flavo. ♀ mesopleuris macula flava triangulari ornatis, segm. 1. dorsalis margine posteriore nigro ♂ capite poene oculos non angustato, ♀ paulum dilatato. Serra fig. 4... .. Spec. nov. *vilarrubiai*

Spec nov. ut f. *dusmeti* Knw. tincta et sculpturata differt serra et colore. ♂ sternitis 1-2 anteapicalibus, hypopygio basi nigratis. ♀ femi-

nibus parte interiore et exteriori (anticis parte exteriori magis minusve) nigratis. Alis flavescentibus apice leniter infumatis; costa, subcosta margine anteriore stigmatique rufo-luteis, stigmate apice infuscato. ♀ segmento 3.-5., ♂ segm. 3.-6. abdominali rubro. Scutellum deplatum. 10 mm.

Penis ♂♂ specierum descriptarum nullo differt.

2 ♂♂ 2 ♀♀, Hispania. Balenyà (Barcelona), 20. et 21. V. 1934 leg. L. Vilarrubia.


1 ♂ 1 ♀ in coll. Conde.

Summas gratias ago domino Vilarrubia pro insectis amabiliter mandatis et Deutsche Entomol. Institute pro nonnullis speciebus ad comparationem mandatis.

Allantus syriacus André

Dr. Enslin 1 ♂ 1 ♀ coll. in Palästina 19-26. IV. 1934 mihi dono dedit et permisit ♂ adhuc ignotum describere.

Mas feminae sculptura staturaque non differt. Capite antennisque nigris, colore flavo sunt: basis mandibularum, labrum, clypeus, orbitae exteriores, genae, macula parva intraorbitalis angulo superiore et inferiore oculorum sita, macula parva supraclypealis. Thorace nigro, colore flavo gaudent: anguli lati posteriores pronoti, tegulae, scutellum et postscutellum carinaeque laterales eorum, vitta postmarginalis epimerorum et episternorum mesopleurarum et metapleurarum. Pedibus luteis, colore nigro sunt: basis coxarum flavarum, femina parte posteriore magis minusve. Abdomine rufo; tergiti 1., tergiti 2. medio lato, tergiti 3. macula parva, ultimis 3 tergitis medio nigris. Species penis apice latiore *A. rufonigri* André eminens. 11 mm.



1. et 2. scutellum *All. dusmeti* Knw. et *All. vilarrubiai* nov. a latere sinistro.

3., 4., 5. serra *All. dusmeti* Knw., *vilarrubiai* nov., *antigae* Knw.